

かゆみの集中ケア

目立たない
半透明パッチ
(実物大)

貼る

かきこわしを防ぐ



かゆみどめ

マキロン®パッチエース

〔抗炎症成分配合〕

赤くはれた



虫さされのかゆみを
鎮める



第2類
医薬品



Daiichi-Sankyo

第一三共ヘルスケア

〈お問い合わせ先〉 第一三共ヘルスケア(株) お客様相談室
電話 0120-337-336
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

03®登録商標

鎮痒消炎薬
マキロンパッチエース

第2類医薬品

【効能・効果】
虫さされによるかゆみ

使用前にこの箱の説明文
書を必ずお読み下さい。

使用上の注意

- ❌【してはいけないこと】（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）
1. 次の部位には使用しないで下さい。（1）水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等又は化膿している患部（2）目の周囲、粘膜等（3）傷口、湿潤（かきこわし）、ただれ、しっしん、かぶれ
 2. 顔面には、広範囲に使用しないで下さい。 3. 長期連用しないで下さい。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
（1）医師の治療を受けている人（2）妊婦又は妊娠していると思われる人
（3）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人（4）患部が広範囲の人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮膚（患部）	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感、かぶれ、色素沈着

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

【成分・分量】本品の膏体100g（1.25m²）中

成 分	分 量	はたらき
デキサメタゾン酢酸エステル	0.025g	かゆみや炎症をおさえます。（抗炎症剤）
ジフェンヒドラミン	1.00g	かゆみをおさえます。（抗ヒスタミン剤）
イソプロピルメチルフェノール	1.00g	殺菌作用があります。（殺菌剤）
トコフェロール酢酸エステル （ビタミンE酢酸エステル）	0.50g	血行促進作用により、皮膚の新陳代謝をよくします。

添加物：アジピン酸ジイソプロピル、メタクリル酸・アクリル酸ブチルコポリマー、BHT、l-メントール

副腎皮質ホルモン（ステロイド）のデキサメタゾン酢酸エステルを配合しています。

【使用法】 1日1～3回患部に貼って下さい。〈使用法に関連する注意〉（1）使用法を厳守して下さい。（2）小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。（3）外用にのみ使用して下さい。（4）汗をかいたり、皮膚がぬれているときは、よくふき取ってから使用して下さい。（5）数時間使用してかゆみがなくなれば、本剤をはがして下さい。（6）同じ場所に長時間の使用はしないで下さい。

【保管及び取扱い上の注意】（1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。（2）小児の手の届かない所に保管して下さい。（3）他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります）（4）品質保持のため、未使用分はアルミ袋に入れ、アルミ袋の切り口をきちんと折り曲げて保管して下さい。（5）表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。 【包装】 直径2.0cm



販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元
救急薬品工業株式会社
富山県射水市戸破32-7

マキロンパッチエース

第2類
医薬品

セルフメディケーション
税 控除 対象

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

MADE IN JAPAN