

使用前にこの箱の説明文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

鎮痛消炎薬 第2類医薬品

ロキソニンEXテープ

特徴

すぐれた鎮痛消炎効果をもつ【ロキソプロフェンナトリウム水和物】を8.1%配合。

さらに2つの有効成分を追加配合。
つらい痛みの芯まで直接浸透してしっかり効く。

1日1回使用。こだわりの薄型設計で、
貼り心地やはがれにくさを追求。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 次の人は使用しないで下さい。
 - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎薬を使用してぜんそくを起こしたことがある人
 - 15歳未満の小児
- 次の部位には使用しないで下さい。
 - 目の周囲、粘膜等
 - しっしん、かぶれ、傷口
 - みずむし・たむし等又は化膿している患部
- 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を使用しないで下さい。
- 連続して2週間以上使用しないで下さい。(本剤は痛みを一時的におさえるものです。痛み等の症状が継続する場合には、使用を中止し、医師の診療を受けて下さい)



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - 医師の治療を受けている人
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 高齢者
 - 次の診断を受けた人 気管支ぜんそく

- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱、青あざができる、色素沈着
消 化 器	胃部不快感、みぞおちの痛み
そ の 他	むくみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

- 使用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
下痢・軟便
- 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。(他の疾患の可能性もあります)

効 能 ・ 効 果

腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

用 法 ・ 用 量

表面のライナー(フィルム)をはがし、1日1回患部に貼付して下さい。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守して下さい。
- 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用して下さい。
- 1日あたり4枚を超えて使用しないで下さい。
- 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとってから使用して下さい。
- 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用して下さい。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- 品質保持のため、開封後の未使用分は袋に入れ、袋のチャックをきちんと閉めて保管して下さい。(5)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。また、アルミ袋を開封した後は、なるべく早く使用して下さい。

成分・分量(膏体100g中)

成 分	分 量	はたらき
ロキソプロフェン ナトリウム水和物	8.10g (無水物として7.14g)	炎症や痛みのもと【プロスタグランジン】をおさえます。
トコフェロール酢酸 エステル	2.3g	患部の血行を促進し、痛みをやわらげます。
l-メントール	3.5g	清涼感を与え、痛みをやわらげます。

添加物：スチレン・イソプレン・スチレンブロックコポリマー、ポリイソブチレン、水添ロジングリセリンエステル、BHT、ステアリン酸亜鉛、流動パラフィン、その他3成分 [1枚あたり(7cm×10cm) 膏体量0.7g]

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。
第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
電話 0120-337-336 受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

02®登録商標

販売元
第一三共ヘルスケア株式会社

東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元

リードケミカル株式会社

富山県富山市日俣77-3

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

MADE IN JAPAN