

ZENOL

ゼノール

エクサム®
液ゲル

液ゲル

肩・関節の
痛みフェルピナク
3.0%
配合

セルフメディケーション

税 控除 対象

ベタつかない
液ゲル

販売名：ゼノールエクサム液ゲル

第2類医薬品

外用鎮痛消炎薬

ZENOL

ご使用に際して、このパッケージに記載の説明書きをよくお読みください。また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

効能・効果

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、筋肉痛、関節痛、打撲、捻挫（ねんざ）、腱鞘炎（手・手首・足首の痛みとはれ）、肘の痛み（テニス肘など）

用法・用量

1日2～4回、適量を患部に塗布してください。

（用法・用量に関連する注意）

（1）スポンジ面が破れるおそれがありますので、お使いになる時は、スポンジ面に液が十分に浸透したことを確かめてから塗布してください。（2）用法・用量を厳守してください。（3）目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。（4）本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。（5）本剤塗布後の患部を、ラップフィルム等の通気性の悪いものでおおわないでください。

成分（100g中）

成分	含量
フェルピナク	3.0g
l-メントール	2.0g

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、香料、トリエタノールアミン、アルコールを含有します。

手の届きにくい肩・関節の痛みに ラクにぬれるロングボディ

肩甲骨などの、ぬりにくい患部に
ラクにぬれます。



フェルビナク3.0%配合



関節など、曲面の患部
にも簡単にぬれます。



ベタつかないので、
服がすぐに着られます。

容器の正しい使い方

- ①スポンジ中央を
しっかり押す



液もれ防止
ストッパー付

- ②スポンジが十分に
湿ったことを確認



- ③ゆっくりと
患部に塗布



販売元

TAIHO

大鵬薬品工業株式会社

東京都千代田区神田錦町1-27

お客様相談室 TEL.0120-4527-66

<https://www.taiho.co.jp/>製造
販売元

三冢製薬株式会社

東京都練馬区豊玉北2-3-1

副作用被害救済制度

電話 0120-149-931

㊞登録商標



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。

(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2) ぜんそくを起こしたことがある人 (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (4) 15歳未満の小児

2. 次の部位には使用しないでください。

(1) 目の周囲、粘膜等 (2) 湿疹、かぶれ、傷口 (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

3. 1週間位使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所にキャップをしっかりと閉めて保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4) 本剤を火気に近づけないでください。また、使用済みの容器は火中に投じないでください。(5) 液が漏れるおそれがありますので、使用後は、キャップをしっかりと閉めてください。(6) 塗料(家具、塗膜床、アクセサリ等)、化粧、絹、皮革等に付着すると変質することがありますので、ご注意ください。(7) 使用期限が過ぎた製品は、使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても、品質保持の点からなるべく速やかに使用してください。