

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

止瀉薬

飲み過ぎ・食べ過ぎによる下痢に
ソルマック キュアールD

®登録商標

販売名：ソルマック キュアールD

〔特徴〕

- ★ロペラミド塩酸塩（止瀉薬）とビオチアスターゼ2000（消化酵素）、ラクトミン（フェカリス菌）の3つの有効成分が下痢の症状にアプローチします。
- ★水なしで飲めるチュアブル錠のため、下痢で困ったそのときに、どこでも手軽に服用することができます。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

1. 次の人は服用しないでください
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を使用しないでください
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
（眠気等があらわれることがあります。）
4. 服用前後は飲酒しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
(3) 急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・吐き気等の症状を伴う下痢のある人。
（本剤で無理に下痢を止めるとかえって病気を悪化させることがあります。）
(4) 便秘を避けなければならない肛門疾患等のある人。
（本剤の服用により便秘が発現することがあります。）
(5) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(6) 授乳中の人。
(7) 高齢者。
(8) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	便秘、腹部膨満感、腹部不快感、吐き気、腹痛、嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

まれに下記のような重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック （アナフィラキシー）	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

（裏面へ続く）

症状の名称	症 状
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、 のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤 等が持続したり、急激に悪化する。
イレウス様症状 (腸閉塞様症状)	激しい腹痛、ガス排出（おなら）の停 止、嘔吐、腹部膨満感を伴う著しい便秘 があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続
又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、
薬剤師又は登録販売者に相談してください

眠気

4. 2～3日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この
文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〈効能・効果〉

食べ過ぎ・飲み過ぎによる下痢、寝冷えによる下痢

〈用法・用量〉

次の量をかむか、口中で溶かして服用してください。下痢が止まれば服用し
ないでください。服用間隔は4時間以上おいてください。

年齢	1 回量	1 日服用回数
成人（15歳以上）	2錠	2回
15歳未満	服用しないでください。	

用法・用量に関連する注意

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 錠剤の取り出し方
右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を
指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出し
て服用してください。（誤ってそのまま飲み込んだ
りすると、食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につ
ながります。）



〈成分・分量と働き〉

(1日量中)

成 分	分 量	はたらき
ロペラミド塩酸塩	1 mg	腸の過剰な運動や腸の粘膜における水 分の吸収・分泌異常を改善して、下痢 を抑えます。
ビオヂアスターゼ2000	90mg	胃腸内にある未消化物の消化を助けます。
ラクトミン（フェカリス菌）	20mg	乳酸菌（善玉菌）が乱れた腸内細菌バ ランスを整えます。

添加物：D-マンニトール、キシリトール、結晶セルロース、クロスポビド
ン、リン酸水素Ca、乳糖水和物、メタケイ酸アルミン酸Mg、ステアリン酸
Mg、l-メントール

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わ
ることがあります。）

お問い合わせはお買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い 申し上げます。	
連絡先	大鵬薬品工業株式会社 お客様相談室 〒101-8444 東京都千代田区神田錦町1-27 電話番号：0120-4527-66 受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く) ホームページ：https://www.taiho.co.jp/



販売元
大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27

製造販売元
大昭製薬株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町大原市場168