

服用に際してはラベルをよくお読み下さい

△ 使用上の注意 相談すること

1.次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
(1)服用後、発疹があらわれた場合(2)しばらく服用しても症状がよくならない場合 2.下痢があらわれることがあるので、下痢の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。

〔効能・効果〕○滋養強壮○虚弱体质○肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

〔用法・用量〕成人(15歳以上)1日1回1本(100mL)を服用して下さい。●小児(15歳未満)は服用しないで下さい。●用法・用量を守つて下さい(他のビタミン等を含有する製剤を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意して下さい)。

④登録商標

L1701



〔成分(1本100mL中)〕タウリン3000mg、イノシトール50mg、ニコチン酸アミド20mg、チアミン硝化物(ビタミンB₁)10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB₂)10mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)10mg、カルニチン塩化物100mg、無水カフェイン50mg 添加物:エリスリトール、アセスルファムK、スクラロース、クエン酸、クエン酸Na、没食子酸プロピル、安息香酸Na、pH調整剤、香料 ●本剤に配合されているビタミンB₂により、尿が黄色になることがあります、心配ありません。

〔保管及び取扱い上の注意〕(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

製造販売元



大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.03-3293-4509
<https://www.taiho.co.jp/>