

matsu
kiyo

Liquid Kakkonto

満量
処方

ツムラの
葛根湯

ツムラの
葛根湯

満量
処方

かぜの
ひきはじめに

体力中等度以上の方に

・鼻かぜ

・頭痛

・肩こり

第2類医薬品

かぜのひきはじめに

体力中等度以上の方に

・鼻かぜ

・頭痛

・肩こり

眠くなる成分は入っていません

第2類医薬品

matsu
kiyo

ツムラの
葛根湯

第2類医薬品

【成分・分量】

本品1日量90mL(30mL×3本)中、以下の生薬より抽出した葛根湯エキス8.3gを含有します。

日局カッコン… 8.0g

日局シャクヤク… 3.0g

日局マオウ… 4.0g

日局カンゾウ… 2.0g

日局タイソウ… 4.0g

日局ショウキョウ… 1.0g

日局ケイヒ… 3.0g

添加物として転化型液糖(白糖・果糖・ブドウ糖)、日局ハチミツ、日局安息香酸ナトリウム、日局パラオキシ安息香酸ブチル、エタノール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、日局クエン酸水和物、日局炭酸水素ナトリウム、香料、エチルバニリン、グリセリン、バニリン、プロピレングリコールを含有します。

副作用被害救済制度

電話0120-149-931

※この商品は(株)マツキヨココカラ&カンパニーのオリジナル商品です。

ここを押してあげてください

第2類医薬品

こんな方におすすめ

・寒気がして、風邪かなと思った方に

・熱があり、汗が出ない方に

・風邪薬を飲んで眠くなると困る方に

【販売名】ツムラ漢方内服液葛根湯

【効能・効果】

体力中等度以上のものの次の諸症:感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

【用法・用量】次の量を、食間に服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1本	3回
15歳未満	服用しないでください	

服用前によく振ってから服用してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

本剤は1回1本の服用で飲みきり、のみ残しのないようにしてください。

【保管および取り扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないでください。

(4)使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

発売元

株式会社ツムラ

東京都港区赤坂2-17-11

製造販売元

大同薬品工業株式会社

奈良県葛城市新村214番地1

MADE IN JAPAN

お客様相談窓口:

0120-329-930

受付時間:9:00~17:30

(土日祝日・年末年始・夏季など特別休業日を除く)

【使用上の注意】

相談すること

1.次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦または妊娠していると思われる人。(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4)胃腸の弱い人。(5)発汗傾向の著しい人。(6)高齢者。(7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(8)次の症状のある人。むくみ、排尿困難(9)次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品(箱)を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3.1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品(箱)を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

4.長期連用する場合には、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください