

※2013年12月改訂

第3類医薬品

のど トキワ南天喉飴（せき止め薬）

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
必要なときに読めるように、大切に保管してください。

「トキワ南天喉飴」は古くからせきやのどのあれなどに効果のある煎じ薬として用いられていた「南天」の実を有効成分とした、黒糖シナモン風味のドロップタイプのせき止め薬です。つらいせき、のどの痛みに効果をあらわします。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬など（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬など）



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

- （1）医師の治療を受けている人。
- （2）妊婦または妊娠していると思われる人。
- （3）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- （4）次の症状のある人。 高熱

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

3. 5～6回服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

効能・効果

せき、のどの炎症による声がれ・のどの
あれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ

用法・用量

食間に服用してください。下表の1回量を1錠ずつ口中に含み、かまず
にゆっくり溶かしてください。なお、1回分を服用後は、2時間以上の間隔を
おいて服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	3錠	3回
8才以上15才未満	2錠	
5才以上8才未満	1錠	
5才未満	服用しないでください。	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
(2)小児に服用させる場合には、保
護者の指導監督のもとに服用させ
てください。

※ 成分・分量

1日量(9錠)中 南天実乾燥エキス……500mg 添加物：黒砂糖、白糖、水アメ、L-メントール、アラ
ビアゴム、カラメル、タルク、カルナウバロウ、赤色3号、青色1号、黄色5号、香料

保管および取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手のとどかない
所に保管してください。(3)品質を保持するため、開封後はフタをしめてください。(4)期限を過ぎ
た製品は服用しないでください。(使用期限は缶の側面に記載)

＜お問い合わせ先＞

本品に関してのお問い合わせは、
お買い求め先または下記までご連絡ください。

常盤薬品工業株式会社
お客さま相談室 0120-875-710
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)
南天のど飴のブランドサイトはこちら
<http://nodoame.jp>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
0120-149-931

製造販売元

常盤薬品工業株式会社
大阪市中央区安土町3-5-12
NOEVIR GROUP

TISI307