

指定医薬部外品

開け口



のどの炎症による痛み・はれに...効く

# アイストローチ®



口腔内の殺菌・消毒

オレンジ味

ノンシュガー

のどの炎症による痛み・はれに...効く

指定医薬部外品

オレンジ味  
ノンシュガー

アイストローチ®

殺菌作用のあるセチルピリジニウム塩化物水和物を配合したトローチ剤です。口腔内に付いた細菌を殺菌消毒し、のどの炎症による痛み・はれ・不快感を治します。

**成分** 1粒(6キロカロリー)中

セチルピリジニウム塩化物水和物・・・1mg

添加物:ビタミンC、*l*-メントール、クエン酸、D-ソルビトール、グリセリン脂肪酸エステル、香料、黄色5号

**効能・効果**

●口腔内の殺菌・消毒 ●のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどの不快感・のどのあれ・声がれ ●口臭の除去

**用法・用量**

大人(15歳以上)及び5歳以上の小児、1回1粒、1日5~6回口中に含み、かまずにゆっくり溶かして服用してください。2時間以上の間隔をおいて服用してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- ①間隔をおかずに続けてトローチを服用すると体質によってはお腹が緩くなる事があります。
- ②5歳未満の乳幼児は、のどにトローチをつめる心配がありますので、服用させないでください。
- ③小児(5歳以上15歳未満)に服用させる場合、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- ④本剤はかみくだいたり、そのままのみこんだりしないでください。

販売

日本臓器製薬株式会社

大阪府中央区平野町4丁目2番3号

お客様相談窓口 ☎06・6222・0441

土・日・祝日及び当社休日を除く 9:00~17:00

製造販売元

高市製薬株式会社

奈良県高市郡明日香村野口10番地

服用に際しては、  
この箱の諸注意をよくお読みください。

## 使用上の注意 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。①医師又は歯科医師の治療を受けている人。②ご本人又はご家族がアレルギー体質の人。③今までに薬などによるアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。皮膚：発疹・発赤、かゆみ
3. 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 保管及び取り扱い上の注意

- ①アルミ袋開封後は、お早めに服用してください。
- ②プラスチックシートからトローチを取り出されたら、すぐに服用してください。
- ③直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- ④小児の手の届かない所に保管してください。
- ⑤他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)

**オレンジ味**  
**ノンシュガー**

のどの炎症による痛み・はれに...効く

**アイストローチ®**

指定医薬部外品