


開け口
▼

貧血に

マスチゲン錠

MASTIGEN® TABLET



第2類医薬品

使用上の注意

® 登録商標

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起きやすくなります)本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。

他の貧血用薬



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

便秘、下痢

4. 2週間位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

製造販売元

日本臓器製薬株式会社

大阪府中央区平野町4丁目2番3号

お客様相談窓口 ☎06・6222・0441

土・日・祝日及び当社休日を除く 9:00~17:00

副作用被害救済制度 ☎0120・149・931

【効能・効果】貧血

【用法・用量】成人(15歳以上)、1回1錠、1日1回、食後に服用する。

【用法・用量に関連する注意】

(1)服用に際しては、説明文書(箱の記載事項)をよく読んでください。また、必要なときに読めるよう大切に保存してください。(2)定められた用法・用量を守って服用してください。(3)水またはぬるま湯で、かまずに服用してください。(4)本剤の服用前後30分は、玉露・煎茶・コーヒー・紅茶は飲まないでください。ほうじ茶・番茶・ウーロン茶・玄米茶・麦茶はさしつかえありません。

【特徴】

- 1.鉄10mgを配合し、1日1回の服用で貧血を改善します。
- 2.胃で溶けず腸で溶けるので、鉄の味やにおいがしにくい。
- 3.鳥レバー111gまたはホウレン草500g中に含まれる鉄と同量の鉄10mgを1錠中に配合しています。
- 4.鉄の吸収を高めるビタミンC、赤血球合成に必要なビタミンB₁₂・葉酸、ビタミンEを配合。

【成分】1錠中

溶性ピロリン酸第二鉄79.5mg(鉄として10mg)、シアノコバラミン50 μ g、葉酸1mg、アスコルビン酸50mg、酢酸d- α -トコフェロール10mg

添加物:ラウリン酸ソルビタン、ゼラチン、白糖、タルク、グリセリン脂肪酸エステル、二酸化ケイ素、セルロース、乳糖、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、クロスポビドン、ヒプロメロースフタル酸エステル、クエン酸トリエチル、ヒプロメロース(ヒドロキシプロピルメチルセルロース)酸化チタン、マクロゴール、カルナウバロウ、赤色102号

【成分に関連する注意】

配合されている溶性ピロリン酸第二鉄により便が黒くなることがあります。



【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないで下さい。誤用の原因や品質が変化することがあります。(4)錠剤の色が落ちることがありますので、濡れた手で錠剤を触らないでください。手に触れた錠剤は、容器に戻さないでください。(5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。(6)容器内に乾燥剤が入っています。誤って服用しないでください。