

開け口
▼

第3類医薬品

肌あれ・にきび・口内炎に

マスチゲン[®]

BBチュアブル錠



実物大

ビタミンC・B₂・B₆配合

水なしでポリポリと
かんで服用

服用は1日1回



マンゴー味

肌あれ・にきび・口内炎に

販売名

マスチゲン®BBチュアブル錠

水なしでポリポリとかんで服用



マンゴー味

第3類医薬品

服用は1日1回

ビタミンC・ビタミンB₂・ビタミンB₆配合の、肌あれ・にきび・口内炎に効く、水なしでポリポリとかんで服用する医薬品のチュアブル錠です。

特長

1. チュアブル錠は、水なしでポリポリとかんで服用できますので、職場や学校で手軽に症状の改善効果を得られます。
2. お肌の真皮層を形成するコラーゲンづくりを助けるビタミンC配合により肌あれを内側から治します。
3. 皮膚を正常な状態にもどすビタミンB₂配合により、ポツポツと赤くはれたニキビを体の中から治します。
4. ビタミンB₆の働きで、しみると痛い口内炎を改善します。
5. 疲れの栄養補給に効果的です。
6. 低カロリー・甘さひかえめ。
7. 外出時に携帯しやすい6錠入シート包装。

効能・効果 次の諸症状の緩和：肌あれ、にきび・吹き出物、口内炎、口角炎(唇の両端の腫れ・ひび割れ)、口唇炎(唇の腫れ・ひび割れ)、湿疹、皮膚炎、かぶれ、ただれ、赤ら顔に伴

う顔のほてり、舌の炎症、目の充血、目のかゆみ

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」

次の場合のビタミンB₂の補給：肉体疲労時、病中病後の体力低下時、妊娠・授乳期

用法・用量 7歳以上15歳未満 1日1回1錠、15歳以上1日1回2錠をそのままかむか、口の中で溶かして服用して下さい。朝・昼・晚いつ服用してもかまいません。水と一緒に服用することもできます。

用法用量に関連する注意 1. 本剤の使用により、尿が黄色くなる場合がありますが、配合されているビタミンB₂の一部が尿中に排泄されるため心配はありません。2. 定められた用法・用量をお守り下さい。3. かむか、口の中で溶かして服用して下さい。4. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。5. 図のようにシート包装の凸部を指先で押して錠剤を取り出して服用して下さい。誤ってシート包装のまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等の思わぬ事故につながりますのでご注意下さい。



▲使用上の注意 相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
- | 関係部位 | 症状 |
|------|-------------------------|
| 消化器 | 胃部不快感、胃部膨満感、食欲不振、吐き気・嘔吐 |
2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。下痢
 3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

保管及び取扱い上の注意

1. アルミ袋開封後は、お早めに服用して下さい。
2. 使用期限を過ぎた製品、使用前に開封された形跡のある製品は服用しないで下さい。
3. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
4. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
5. 他の容器に入れ替えないで下さい。誤用の原因になったり品質が変わります。

ご使用に際して、この箱の説明書をよくお読み下さい。また、必要なときに読めるよう大切に保管して下さい。

成分 2錠中(3.3キロカロリー)

ビタミンB₂酪酸エステル…… 20mg 傷んだ皮膚や粘膜を回復させます。
 ビタミンB₆…… 50mg 皮膚や粘膜の細胞の新陳代謝を助けます。
 ビタミンC …… 250mg お肌のコラーゲンづくりを促進します。
 添加物としてトウモロコシデンプン、粉末還元麦芽糖水アメ、スクラロース、ステアリン酸Mg、D-マンニトール、軽質無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、黄色5号、香料を含みます。

販売

日本臓器製薬

大阪市中央区平野町4丁目2番3号
 お客様相談窓口 ☎06-6222-0441
 土・日・祝日を除く 9:00~17:00

製造販売元

日新薬品工業株式会社
 滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1

副作用被害救済制度
 ☎0120-149-931