

携帯に便利な

薬袋包装!!

hisamitsu®

サイズ:7cm×10cm

フェイタス[®]

フェルピナク配合テープ剤

5.0



当社従来品に比べて
パッケージ(外箱)を省き
紙の使用量を減らしました。

肩などの

痛み

に
直接浸透!

セルフメディケーション

税 控除 対象

ビタミンE^{*}
配合

微香性

ピッタリフィット
全方向伸縮

第2類医薬品

▼開封後はチャックを合わせ、密閉保存してください。

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

お客様相談室: TEL.0120-133250 受付時間 / 9:00-17:50(土日・祝日・会社休日を除く)

製造販売元



久光製薬株式会社

〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地

<https://www.hisamitsu.co.jp>

切り口 → → → 矢印の方向に引くと、手で簡単に切れま

▼開封後はチャックを合わせ、密閉保存してください。

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要などきにすぐ読めるように大切に保管してください。

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。

1. 次の人は使用しないでください。(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) ぜんそくを起こしたことがある人。(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(4) 15歳未満の小児。**2. 次の部位には使用しないでください。**(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。(3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。**3. 連続して2週間以上使用しないでください。**

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。(1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。**2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。**

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

3. 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

■ 効能・効果

関節痛、筋肉痛、腰痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとはれ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、ねんざ、肩こりに伴う肩の痛み

■ 用法・用量

表面のフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

経皮鎮痛消炎テープ剤
販売名：フェイタス®5.0

第2類医薬品

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 15歳未満の小児に使用させないでください。(2) 定められた用法・用量を守ってください。(3) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。(4) 汗をかいたり皮膚がぬれている時は、よくふき取ってから使用してください。(5) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

■ 成分・分量 (膏体100g中)

フェルピナク	5.0g
ℓ-メントール	3.5g
トコフェロール酢酸エステル	2.3g
(*ビタミンE誘導体)	

添加物として、水添ロジングリセリンエステル、スチレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、ステアリン酸亜鉛、BHT、ポリイソブチレン、流動パラフィン、その他1成分を含有します。

■ 保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光や高温をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。(4) 開封後はチャックをしっかり閉めて保管してください。(5) 使用期限(この薬袋に記載)を過ぎた商品は使用しないでください。

詳しい情報は
こちらへ ▶



1E190T