

この説明文書は、本剤とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。

第②類医薬品

ヒヤこどもせきシロップN

せきどめ薬

ヒヤこどもせきシロップNは、お子さまのいろいろな原因によるせきをしずめ、痰をきってのどを楽にする鎮咳去痰薬です。3ヵ月以上15才未満のお子さま用に開発されたシロップ剤で、以下のような特長があります。

- ・ノンシュガー（キシリトール使用）
- ・ノンカフェイン
- ・のみやすいマスクメロン味
- ・無着色
- ・安全キャップ採用

せきが長びくと、お子さまの睡眠や食事をさまたげ、体力を消耗させてしまいます。できるだけ早めにお手当てをしてあげましょう。

⚠ 使用上の注意 本剤は小児用ですが、鎮咳去痰薬（せきどめ薬）として定められた一般的な注意事項を記載しています。

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。）

1. 次の人は服用しないでください。

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。（眠気等があらわれることがあります。）



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1)医師の治療を受けている人。

(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3)高齢者。

(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(5)次の症状のある人。……………高熱、排尿困難

(6)次の診断を受けた人。……………心臓病、高血圧、糖尿病、
緑内障、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ	精神神経系	めまい
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振	泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック （アナフィラキシー）	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。……………□のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

（裏面も必ずお読みください。）

ヒヤこどもせきシロップN

効能・効果 せき、たん

成分・分量 (36mL中)


クエン酸チペピジン.....36mg dl-メチルエフェドリン塩酸塩..... 45mg
グアヤコールスルホン酸カリウム.....162mg クロルフェニラミンマレイン酸塩..... 7.2mg
添加物：キシリトール、D-ソルビトール、塩化Na、クエン酸、クエン酸Na、サッカリンNa、安息香酸Na、パラベン、プロピレングリコール、香料

用法・用量

年 令	11才以上 15才未満	8才以上 11才未満	5才以上 8才未満	3才以上 5才未満	1才以上 3才未満	3ヵ月以上 1才未満	3ヵ月未満
1 回量	6mL	5mL	3mL	2.5mL	2mL	1mL	服用しないこと

1日3回毎食後及び就寝前に服用してください。また、1日6回まで服用してもさしつかえありませんが、その場合には約4時間の間隔をあけてください。

添付の目盛り付きカップで量をはかり、服用してください。使用後のカップはよく水洗いし、本剤とともに清潔に保管してください。



安全キャップの使用方法

●あけ方 図のように①キャップを強く押しながら②矢印の方向(時計と反対まわり)にまわしてあけます。キャップが固い時はお湯(50~60℃)で温めてください。

●しめ方 服用のつどピンの口の周囲をよくふいて、きれいにしてから、普通のキャップをしめる要領でしめてください。



〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法及び用量をお守りください。
- (2)小児に服用させる場合は保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。
- (5)いったん開栓した後は、品質保持の点から長期保存しないでください。

●お問い合わせは樋屋奇応丸株式会社〈発売元〉まで

お客様相談室 電話：072-871-2990

〒574-0014 大阪府大東市寺川3-3-63

受付：月～金曜日(祝日を除く)9:00～17:30

樋屋奇応丸ホームページアドレス <http://www.hiyakiogan.co.jp>



〈発 売 元〉 樋屋奇応丸株式会社
〒530-0043 大阪市北区天満1-4-11

〈製造販売元〉 萬金薬品工業株式会社
〒634-0145 奈良県高市郡明日香村野口317