

COOL

ウィルス・
細菌などを

殺菌する

ポビドンヨード配合

浅田飴

のどクール スプレー

痛み・はれ

不快感・声がれ

第3類医薬品



①

キャップを
はずしてください。
※最初は液が
出るまで空押しを
行ってください。




②

ノズルは
回転できます。



③

ノズルの先端を患部に向けて、
噴射塗布してください。
※吸入しないようにアーンと声を出しながら噴射してください。



④

使用後は
きちんと
キャップをはめて
保管してください。



副作用救済制度 0120-149-931

第3類医薬品

口腔内殺菌消毒薬
ノンガスタイプ

浅田館 のどクールスプレー

△ご使用上の注意

してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]

1. 次の人は使用しないでください。

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 長期連用しないでください。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

(1) 妊婦又は妊娠していると思われる人

(2) 授乳中の人

(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

(4) 口内にひどいただれのある人

(5) 甲状腺機能障害の診断を受けた人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【効能・効果】

のどの炎症によるのどのあれ・のどの痛み・のどのはれ・のどの不快感・声がれ

【用法・用量】

1日数回、適量をのどの粘膜面に噴射塗布してください。

- 定められた用法、用量を厳守してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- のどの塗布用にのみ使用してください。
- ノズルをのどの患部に向けて、アーッと声を出しながら噴射してください(息を吸いながら使用すると、液が気管支や肺に入ることがあります)。
- 目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流し、直ちに眼科医の診療を受けてください。

【成分・分量】100mL中

ポビドンヨード 0.45g

添加物としてヨウ化K、DL-リンゴ酸、グリセリン、l-メントール、エタノール、香料含有

●本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変化します)。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (5) 薬液がこぼれ衣類などに付着した場合には、すぐに水又は洗剤で洗ってください。

発売元

 株式会社浅田館

東京都東村山市久米川町5-29-7

●お問合せ先 お客様相談室

電話 03-3953-4044(ダイヤルイン)

時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 ジャパンメディック株式会社

富山県富山市横越168