

matsu
kiyo

Throat Drops

浅田飴のどドロップOG

指定医薬部外品

1日3~6回

オレンジ味
ノンシュガー



原寸大

のどのあれ・痛み 声がれに

薬のはたらき

のどのあれ・痛み

声がれ

セチルピリジニウム塩化物水和物:6mg
(1日量(12粒)中)

・のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの
不快感・のどの痛み・のどのはれを軽減します

浅田飴のどドロップOG 指定医薬部外品

この箱は、服用の際にはよくお読みください。

こんな方におすすめ ● のどの炎症によるのどのあれ・痛み・声がれを軽減したい方に

効能・効果

口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去、のどの炎症による声がれ・の
どのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ

用法・用量

1粒ずつ2粒までを口中に含み、かまずにゆっくり溶
かして服用してください。2時間以上の服用間隔を
おいてください。※1度に2粒を口中に含まず、1粒
ずつなめてください。(1)定められた用法、用量を厳
守してください。(2)小児に服用させる場合には、保
護者の指導監督のもとに服用させてください。(3)か
みくだいたり、のみこんだりしないでください。

年 齢	1回量	服用回数
大人(15歳以上)	2粒	1日 3～6回
小児(5歳以上)		
乳幼児(5歳未満)	×服用しないこと	

成分・分量 1日量(12粒)中

セチルピリジニウム塩化物水和物.....6mg

添加物:還元水アメ、グリセリン脂肪酸エステル、グリチルリチン酸2K、アセスル
ファムK、塩化Na、DL-リンゴ酸、L-メントール、D-ソルビトール、黄色5号、香料

使用上の注意

相談すること 1.次の人は服用前に医師、歯科医師又は薬剤師
にご相談ください。(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人
(2)本人又は家族がアレルギー体質の人 (3)薬によりアレルギー
症状を起こしたことがある人 2.次の場合は、直ちに服用を中止
し、この製品を持って医師、歯科医師又は薬剤師にご相談くださ
い。(1)服用後、次の症状があらわれた場合[皮ふ]発疹・発赤、か
ゆみ (2)5~6日間服用しても症状がよくなる場合

〈保管及び取扱い上の注意〉(1)直射日光の当たらない湿気の少ない
涼しい所に保管してください。(2)開封後は袋の口を折り返して保管し
てください。開封後長期になると、つやの消失、溶解等の変化があらわ
れることがあります。(3)小児の手の届かない所に保管してください。
(4)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質
が変化します)。(5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【お問合せ先】 株式会社浅田飴 お客様相談室
電話:03-3953-4044 受付時間:9時~17時(土、日、祝日を除く)

※この商品は(株)マツキヨココカラ&カンパニーのオリジナル商品です。

製造販売元
株式会社浅田飴
東京都東村山市久米川町5-29-7