

2014年3月作成

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

## 経皮鎮痛消炎剤

# パスタイム<sup>®</sup>ZX-L

第2類医薬品

### 【特長】

- ジクロフェナクナトリウムを2%配合したテープ剤です。
- 1日1回で24時間効き続けます。
- 微香性で、人前でも気になりません。
- ライナーが3ピース（中央剥離方式）ですので、はりやすい。

### ⚠ 【使用上の注意】

#### ☒ してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります〕

1. 次の人は使用しないでください。
  - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (2) ぜんそくを起こしたことがある人
  - (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (4) 15歳未満の小児
2. 次の部位には使用しないでください。
  - (1) 目の周囲、粘膜等
  - (2) 湿疹、かぶれ、傷口
  - (3) みすむし・たむし等又は化膿している患部
3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を併用しないでください。
4. 連続して2週間以上使用しないでください。



#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 他の医薬品を使用している人
  - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (4) テープ剤でかぶれ等を起こしたことがある人
  - (5) 次の診断を受けた人  
消化性潰瘍、血栓障害、肝臓病、腎臓病、高血圧、心臓病、インフルエンザ
  - (6) 次の医薬品の投与を受けている人  
ニューキノロン系抗菌剤、トリアムテレン、リチウム、メトトレキサート、非ステロイド性消炎鎮痛剤（アスピリン等）、ステロイド剤、利尿剤、シクロスボリン、選択的セロトニン再取り込み阻害剤
  - (7) 高齢者
2. 使用中又は使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、痛み、刺激感、熱感、皮ふのあれ、落屑（けし）、アカのような皮ふのはがれ）、水疱、色素沈着

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。
接触皮ふ炎 光線過敏症	貼付部に強いかゆみを伴う発疹・発赤、はれ、刺激感、水疱・ただれ等の激しい皮ふ炎症状や色素沈着、白斑があらわれ、中には発疹・発赤、かゆみ等の症状が全身に広がることがあります。また、日光が当たった部位に症状があらわれたり、悪化することがあります。

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

#### 【効能・効果】

腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎（手・手首の痛み）、肘の痛み（テニス肘など）、打撲、捻挫

【用法・用量】プラスチックフィルムをはがし、1日1回1枚を患部に貼ってください。ただし、1回あたり1枚を超えて使用しないでください。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。

#### 用法・用量に関する注意

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 1回あたり24時間を超えてはり続ける場合は、同じ患部にはりかえる場合は、その貼付部位に発疹・発赤、かゆみ、かぶれなどの症状が起きていないことを確かめてから使用してください。
- (3) 本剤は、痛みやはれなどの原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれなどの症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。
- (4) 汗をかいたり、患部ぬれています時は、よくふき取ってから使用してください。
- (5) 皮ふの弱い人は、使用前に腕の内側の皮ふの弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上はり、発疹・発赤、かゆみ、かぶれなどの症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (6) 使用部位に他の外用剤を併用しないでください。

【成分・分量】膏体100g中 [1枚あたり(10cm×14cm) 膏体質量1.5g]

ジクロフェナクナトリウム ······ 2.0g

添加物としてメントール、流動パラフィン、ステレン・イソブレン・ステレンブロック共重合体、ポリブテン、脂環族飽和炭化水素樹脂、その他1成分を含有します。

#### 【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手のとどかない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
4. 開封後は袋の口を折りまげて保管し、使用期限内であっても、早めに使用してください。
5. 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

【包装】10cm×14cm 7枚(7枚/袋×1袋)

製造販売元 ◎祐徳薬品工業株式会社

佐賀県鹿島市大字納富分2596番地1

[お客様相談窓口] TEL.0954-63-1320

受付時間 9:00~17:00 (土,日,祝日は除く)

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

☎ 0120-149-931