

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。


ロート 抗菌目薬EX

ものもらい・結膜炎の治療に

眼科用薬・10mL

第2類医薬品

小さなお子さまにも*



ものもらいは、身の回りにいる細菌がまぶたの脂腺などに入り込み、ハレや炎症を起こします。結膜炎は、細菌が結膜に感染して起こることが多く、白目が充血したり、目やにが多く出たりします。

原因菌の繁殖を抑える

サルファ剤

炎症を鎮める

グリチルリチン酸二カリウム

かゆみを止める

抗ヒスタミン作用を持つ
クロルフェニラミンマレイン酸塩

血行を促す

天然型ビタミンE

目の表面に有効成分が長くとどまる滞留性設計

睡眠不足や疲れ等により抵抗力が落ちていたりすると
ものもらいや結膜炎などを引き起こしやすくなります。
ものもらい・結膜炎には「ロート抗菌目薬EX」とたっぷりの休息を。

いつでも、どこでも、スムーズに点眼できる
フリーアングルノズル®



簡単にアイケアできて、とっても便利です。

ワンタッチ式スクリューキャップ



開ける時は左に1回カチッと回し、閉める時も
右に1回カチッと回すだけ。簡単便利です。

使用上の注意

してはいけないこと

-  (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
- *1. 次の人は使用しないでください。
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 長期連用しないでください。

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
- (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 次の症状のある人
はげしい目の痛み
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を

中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

*まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック(アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる

3. 3～4日間使用しても症状がよくなりない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

効能・効果

ものもらい、結膜炎(はやり目)、目のかゆみ、眼瞼炎(まぶたのただれ)

用法・用量

1回2～3滴、1日5～6回点眼してください。

用法・用量に関連する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。
[汚物や異物混入(目やにやホコリ等)の原因となる]
また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (4) 点眼用にのみ使用してください。



容器の先と目やまつ毛がふれることのないように


有効成分

スルファメトキサゾールナトリウム…4.00% クロルフェニラミンマレイン酸塩……0.02%
グリチルリチン酸二カリウム………0.15% 酢酸d-α-トコフェロール(天然型ビタミンE) 0.01%
添加物として、アミノカプロン酸、ホウ酸、ホウ砂、エデト酸Na、ヒプロメロース、ベンザルコニウム塩化物、ポリソルベート80、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、pH調節剤を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、過度の高温(自動車内や暖房器具の近く等)及び過度の低温(冷蔵庫の中等)をさけ、なるべく涼しい所に保存してください。
- (2) キャップを閉める際は、カチッとするまで回して閉めてください。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (5) 他の人と共用しないでください。
- (6) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、一度開封した後は2～3ヶ月以内にご使用ください。
- (7) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用ください。
- (8) 容器に他の物を入れて使用しないでください。

※点眼により口中に苦味を感じることがありますが、薬液が涙道を通して流れでてくるため、無害ですから心配ありません。



お問合せ先

コミュニケーションコール

0120-610-755

受付時間/9:00～17:00(土、日、祝除く)

ロート製薬株式会社

大阪市生野区巽西1-8-1