

ROHTO

医薬品

口角炎・ 口唇炎に

ガサガサ

皮むけ

ひびわれ

5つの有効成分が
荒れた唇をしっかりと治療

口唇炎・口角炎治療薬

医薬品

そのままぬれる
ドーム型

修復	血行促進	代謝促進	抗炎症	殺菌作用
アラントイン	ビタミンE 誘導体	ビタミンB6	グリチル レチン酸	セチルピリジニウム 塩化物水和物



メンソレータム® メディカルリップ



無香料・無着色・メントール無配合

第3類医薬品

無香料・無着色・メントール無配合

販売名

メンソレータム®メディカルリップnc

第3類医薬品

5つの有効成分で荒れた唇をしっかり治療して、しっとりなめらかに。

- アラントイン……………荒れた唇の修復を促進。
- ビタミンE誘導体……………血行を促進し、口唇炎による荒れに効果的。
- ビタミンB6……………皮膚の新陳代謝を促進。
- グリチルレチン酸……………唇の炎症を抑える。
- セチルピリジニウム塩化物水和物……………殺菌作用。
- メントール無配合で、敏感な唇にもしみにくい、やさしい使い心地。

【使用上の注意】

●相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

(1)医師の治療を受けている人 (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3)湿潤やただれのひどい人

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。皮フ：発疹・発赤、かゆみ

3.5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【効能・効果】口唇のひびわれ、口唇のただれ、口唇炎、口角炎

【用法・用量】1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉(1)目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けること。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(3)口唇への外用にのみ使用すること。

【有効成分】トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE誘導体)0.2%、グリチルレチン酸0.3%、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)0.1%、アラントイン0.5%、セチルピリジニウム塩化物水和物0.1% ※添加物として、ステアリン酸グリセリン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、流動パラフィン、ワセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、サラシミツロウ、ポリエチレン、パラベン、BHT、パルミチン酸デキストリン、ジメチルポリシロキサンを含有する。

【保管及び取り扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早く使用すること。

※冬期など気温が低いときに製剤が硬くなって取りにくいときは、手で温めてからご使用ください。

副作用被害救済制度の問合せ先 0120-149-931

お問合せ先:お客さま安心サポートデスク

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00～18:00(土、日、祝日を除く)

ロート製薬株式会社

大阪市生野区巽西1-8-1

MADE IN JAPAN