

ROHTO



おしりのトラブルに...

リシーナ

軟膏

痔の痛み・出血・はれ・かゆみに

第2類医薬品



便をした後、
痛い・ティッシュに血が...



肛門のあたりが
プクッと腫れて、痛みが...

☆肛門外側の切れ痔（裂肛）やいぼ痔（外痔核）などに

裂肛とは、便秘などによる硬い便で、肛門皮フが切れてしまった状態。切れた部分から細菌が入ると化膿したり、長期間裂肛を繰り返していると、肛内が狭くなってしまうことも。

外痔核とは、肛門外側がうっ血して腫れた状態です。肛門皮フは感覚神経が通っているため、痛みを感じ、出血することもある。

こんな痔の症状を感じたら、がまんをせずに早めに治すことが大切です。

メンソレータムリシーナ軟膏Aは

「つらい痔の諸症状を効果的に治療する」ことを目的に作られた痔のお薬。

抑える



消炎成分が
炎症を抑えます。

ヒドロコルチゾン酢酸エステル

酸化亜鉛

l-メントール

はれ・ただれ等の
炎症を抑えます

鎮める



痛みを止める成分

W

で配合！
つらい痛みを
しっかり鎮めます。

アミノ安息香酸エチル

リドカイン

つらい痛みとかゆみを
しっかり鎮めます

改善する



傷ついた組織を修復し、
ビタミンE誘導体が血行を促進。
いぼ痔の主な原因である
うっ血を改善します。

イソプロピルメチルフェノール

患部を殺菌し、細菌の感染を防ぎます


アラントイン

傷ついた組織を修復します

トコフェロール酢酸エステル

血行を促進し、うっ血を改善します

◆ベタつかず、伸びがよい
さらっとタイプの軟膏。
指先軽くスッと広がるので、
傷んだ患部に負担をかけずに
薬剤が肛門細部にまで行き渡ります。



◆患部に直接塗れる
軟膏タイプ。



使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう保管してください。

販売名:メンソレータムリシーナ軟膏A
【痔疾用外用薬】 第2類医薬品

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

- 1.次の人は使用しないでください。
（1）患部が化膿している人
- 2.長期連用しないでください。

👤 相談すること

- 1.次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。
（1）医師の治療を受けている人 （2）妊婦または妊娠していると思われる人
（3）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 2.使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
そ の 他	刺激感、化膿

- 3.10日間位使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

効能・効果

きれ痔（さけ痔）・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・ただれ・出血の緩和及び消毒

成 分

100g中

有効成分	配合量
アミノ安息香酸エチル	2.0g
リドカイン	2.4g
ヒドロコルチゾン酢酸エステル	0.5g
酸化亜鉛	10.0g

有効成分	配合量
ℓ-メントール	0.2g
イソプロピルメチルフェノール	0.1g
アラントイン	0.5g
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE誘導体)	1.0g

添加物として、マクロゴール、ワセリン、トウモロコシデンブ、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、パラベン、エデト酸Naを含有する。

用法・用量

適量を取り、肛門部に塗布してください。なお、1日3回まで使用できます。

【用法・用量に関連する注意】

- <1>用法・用量を厳守してください。
- <2>小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- <3>肛門部にのみ使用してください。

保管及び取り扱い上の注意

- <1>直射日光のあたらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管してください。
- <2>小児の手の届かないところに保管してください。
- <3>他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる）
- <4>使用期限（外箱に記載）を過ぎた製品は使用しないでください。
なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早くご使用ください。
- <5>マニキュアや家具類の塗装面等に付着するとはがれや変質を起こすことがありますので、付着しないようにご注意ください。

お問い合わせ先:お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

ロート製薬株式会社

大阪市生野区巽西1-8-1

400478004