

使用前にこの説明書をよくお読みください。また、必要な時に読めるよう保管してください。



フレディ
さらさらなクリーム

デリケート部位の
かゆみ・かぶれを治す


第2類医薬品

販売名:メンソレータム®フレディ®メディカルクリームn

鎮痒消炎薬 弱酸性・非ステロイド系

デリケート部位のかゆみを素早く鎮め、
かぶれなどの炎症をしっかり治す。

5つの有効成分で、つらいかゆみを素早く鎮めるとともに、かゆみの発生を元から抑え、
かぶれなどの炎症もしっかり治す。



つらいかゆみを快適に治したい!
べたつかないさらさらなクリーム

デリケート部位の炎症は、生理用品や汗によるムレ、下着によるこすれなどが原因で引き起こされることがあります。そんなムレた部位に、さらさらパウダー配合で、べたつかず、しっかり密着するのに軽いつけ心地のクリームが、不快なかゆみ、かぶれを治します。また、せっけんの香りで心地よい使用感です。

- ✓ 生理時のナプキンかぶれ、ムレによるかゆみ
- ✓ おりものによるかゆみ
- ✓ 下着やストッキングなど汗ムレによるかぶれ・かゆみ
- ✓ 外陰部や内股のかぶれ
- ✓ その他の炎症、かゆみ、かぶれなどに

せっけんの
香り

ムレた患部にも
べたつかない
さらさらな
クリーム

肌と同じ弱酸性です。

※本剤はカンジダ症、トリコモナス症などの治療薬ではありません。

*血行を促進することによる作用

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)

1. 次の部位には使用しないでください。
目や目の周囲、口唇などの粘膜の部分等



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(3) 湿潤やただれのひどい人 (4) 妊婦又は妊娠していると思われる人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮フ	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

効能・効果 かゆみ、かぶれ、皮フ炎、湿疹、ただれ、じんましん、あせも、虫さされ、しもやけ

用法・用量 1日数回、適量を患部に塗布してください。

【用法・用量に関連する注意】

(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(2) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
(3) 外用にのみご使用ください。

成分・作用 (100g中)

有効成分	配合量	作用
リドカイン	2.0g	かゆみを素早く鎮めます。(局所麻酔作用)
ジフェンヒドラミン	1.0g	かゆみの発生を止めます。(抗ヒスタミン作用)
グリチルリチン酸二カリウム	1.0g	炎症やかぶれをしっかり抑えます。(消炎作用)
トコフェロール酢酸エステル	0.5g	血行を促進し、患部の治り、修復を促進します。(ビタミンE誘導体)
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	雑菌の繁殖を防ぎます。(殺菌作用)

添加物として、ヒアルロン酸Na、グリセリン、セタノール、ステアリン酸、パラフィン、パルミチン酸イソプロピル、オレフィンオリゴマー、1,3-ブチレングリコール、タルク、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、乳酸セチル、カルボキシビニルポリマー、ジメチルポリシロキサン、ステアリン酸グリセリン、乳酸、エドト酸Na、パラベン、香料を含有する。

保管及び取扱上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
(4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。
なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早くご使用ください。

お問い合わせ先:お客さま安心サポートデスク

お気軽にお問い合わせください。女性スタッフが丁寧にお応えします。

フレディコール:06-6758-1422

受付時間 9:00～18:00(土、日、祝日を除く)

ROHTO

ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1

401197903