

ロート製薬

効く、漢方の力を。

飲みやすい錠剤タイプ

和漢箋 小青竜湯

わかんせん® しょうせいりゅうとう

止まらない 鼻水

鼻炎・花粉症に

アレルギー反応を抑え

辛い鼻炎に

内側からしっかり効く

鼻水や水様のたんを伴う咳が出る方の…

✓アレルギー性鼻炎

✓感冒(かぜ)

税 控除対象

第2類医薬品 (販売名) 新・ロート小青竜湯錠Ⅱ

眠くなる成分
無配合

1日2回 食前又は食間に



この外箱は、本剤とともに保管し、
服用の際にはよくお読みください。

押してあける

⚠ 使用上の注意

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 体の虚弱な人 (体力の衰えている人、体の弱い人) (4) 胃腸の弱い人 (5) 発汗傾向の著しい人 (6) 高齢者 (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 (8) 次の症状のある人: むくみ、排尿困難 (9) 次の診断を受けた人: 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

●まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1ヵ月位(感冒に服用する場合には5~6日間)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【効能・効果】体力中等度又はやや虚弱で、うすい水様のたんを伴うせきや鼻水が出るものの次の諸症: 気管支炎、気管支ぜんそく、鼻炎、アレルギー性鼻炎、むくみ、感冒、花粉症

【用法・用量】

次の量を食前又は食間に、
水又は白湯で服用すること。

※食間とは、食後2~3時間をさす。

〈用法・用量に関連する注意〉(1) 用法・用量を厳守すること。(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【成分・分量】8錠中 小青竜湯エキス(1/2量) 1950mg (マオウ1.5g、シャクヤク1.5g、カンキョウ1.5g、カンゾウ1.5g、ケイヒ1.5g、サイシン1.5g、ゴミシ1.5g、ハンゲ3.0gより抽出)を含む。

添加物: セルロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、炭酸水素K、CMC-Ca、ステアリン酸Mg

※本剤は天然物(生薬)のエキスをを用いているため、錠剤の色が多少異なることがある。

【保管及び取り扱い上の注意】(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管すること。(2) 小児の手の届かないところに保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる) (4) 湿気により、変色など品質に影響を与える場合があるので、ぬれた手で触れないこと。(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。なお、使用期限内であっても一度開封した後はなるべく早く使用すること。

製造販売元: ロート製薬株式会社 セルフメディケーション

大阪市生野区巽西1-8-1

税 控除対象

和漢箋

わかんせん®

小青竜湯

しょうせいりゅうとう

体の中から働きかけて、
辛い鼻水などの
鼻炎、花粉症に
しっかり効きます。



お客さま安心サポートデスク

お気軽にご相談ください。

東京: 03-5442-6020

大阪: 06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00

(土、日、祝日を除く)

漢方製剤

和漢箋

わかんせん®

小青竜湯

しょうせいりゅうとう

こんな症状に
効きます。

- ✓辛い花粉症
- ✓鼻水が止まらないなどのアレルギー性鼻炎
- ✓鼻水、せきが出るなどの感冒(かぜ)
- ✓気管支炎など

わかんせん

「和漢箋®」シリーズは、
漢方の力を活かした
体の内側から効く
医薬品です。

副作用被害救済制度の問合せ先
0120-149-931