

## 年齢や乾きに伴うつらい眼疲労、 かすみに効く

# ロートV アクティブ

販売名:ロートVアクティブ

13mL 第3類医薬品

- ◆製品特徴 ①代謝促進成分\*が最大濃度\*入っており、年齢などによる眼疲労時の回復力を高める処方です。
- ②涙液成分補給で、乾きからくる疲れ目に効果を発揮します。
- ③ゴマ油(製剤の安定剤)、ハッカ油(清涼化剤)、ユーカリ油(清涼化剤)配合で、うるおい感のあるすっきり気持ちのいいさし心地です。

\*パンテノール、タウリン、ビタミンB6のことをさす

※一般用眼科用薬製造承認基準の最大濃度配合

### ◆容器特徴

いつでも、どこでも、スムーズに点眼できる  
**フリーアングルノズル®**



簡単にアイケアできて、とっても便利です。

### ワンタッチ式スクリュー キャップ



開ける時は左に1回力チッと回し、閉める時も右に1回力チッと回すだけ。簡単便利です。

### 使用上の注意 △

#### 相談すること



1.次の人は、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 次の症状のある人  
はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人 緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3. 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 目のかすみが改善されない場合
- (2) 2週間位使用しても症状がよくならない場合

### 用法・用量

1回1~3滴、1日5~6回点眼してください。

#### 用法・用量に関する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。  
〔汚染や異物混入(目やにやホコリ等)の原因となる〕  
また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (4) 点眼用にのみ使用してください。



容器の先と  
目やまつ毛が  
ふれることのないように

## ◆成分

有効成分	配合量	はたらき
パンテノール	0.1%	新陳代謝を促進して目の疲れを改善します。
タウリン	1%	新陳代謝を促進して目の疲れを改善します。
コンドロイチン硫酸 エステルナトリウム	0.5%	涙液成分補給で、角膜表面を保護して目の疲れを改善します。
ビタミンB6	0.1%	新陳代謝を促進して目の疲れを改善します。
ネオスチグミンメチル 硫酸塩	0.005%	遠近調節機能を回復して目の疲れを改善します。
グリチルリチン酸 二カリウム	0.1%	抗炎症作用でかゆみ・充血を抑えます。
クロルフェニラミン マレイン酸塩	0.01%	ヒスタミンをブロックして目のかゆみを抑えます。

※添加物として、ゴマ油、ハッカ油、ユーカリ油、塩化Na、アミノカプロン酸、ホウ酸、ポリソルベート80、l-メントール、dl-カンフル、ゲラニオール、エデト酸Na、ベンザルコニウム塩化物、pH調節剤を含有します。

## 効能・効果

- |                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| ○目のかすみ(目やにの多いときなど) | ○眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど) |
| ○目の疲れ              | ○眼瞼炎(まぶたのただれ)                |
| ○結膜充血              | ○紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)        |
| ○目のかゆみ             | ○ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感    |

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所(40°C以上)に放置しないでください。
- (2)キャップを閉める際は、力チックとするまで回して閉めてください。
- (3)小児の手の届かない所に保管してください。
- (4)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (5)他の人と共用しないでください。
- (6)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- (7)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとつてご使用ください。
- (8)容器に他の物を入れて使用しないでください。



## お問い合わせ先:お客様安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などを  
お聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

**東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230**

受付時間9:00~18:00(土、日、祝日を除く)



ロート製薬株式会社  
大阪市生野区巽西1-8-1

401429701