




【メディカルローション】

こんな大人のニキビに悩んでいませんか？


- ☑ アゴや口周りなど、フェイスラインに出来る
- ☑ 生理前やストレスを感じる時などに、繰り返し出来る
- ☑ 同じ場所に出来て、痕が残りやすい

【ニキビのできるメカニズム】


※「アクネ菌の巣」とは、アクネ菌同士が好んで集まっているかたまりのこと。




古い角質が溜まる



毛穴をふさぎ
 皮脂が溜まる




溜まった皮脂とアクネ菌等
 の影響により炎症が起きる



アクネ菌が繁殖し、化膿すると
 痕が残りやすくなります

アクネ菌のバイオフィルムへの働き

アクネ菌が形成するバイオフィルムにより
 殺菌剤によっては効果を発揮しにくくなります。
 殺菌成分：イソプロピルメチルフェノールは、
 バイオフィルムを壊してアクネ菌を殺菌し、
 ニキビの進行をおさえます。



ニキビを治す3つの効果

- 1 **殺菌(イソプロピルメチルフェノール)**
 アクネ菌などを殺菌し、ニキビにしっかり効きます。
- 2 **抗炎症(アラントイン)**
 できてしまったニキビの炎症・赤み・はれをしずめます。
 傷ついた組織を修復する効果もあります。
- 3 **角質軟化作用(サリチル酸)**
 角質軟化作用で古い角質を取り除き、つまった毛穴を開きます。

うるおい成分
 配合

オイルフリー

【アクネス25シリーズ】



ポイント使いにクリームタイプ
 メンソレータム®アクネス25
 メディカルクリームc

第2類医薬品 16g



フェイスラインにも使いやすい
 ローションタイプ
 メンソレータム®アクネス25
 メディカルローションb

第2類医薬品 100mL



背中にも使いやすい
 ミストタイプ
 メンソレータム®アクネス25
 メディカルミストb

第2類医薬品 100mL

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

販売名：メンソレータムアクネス25メディカルローションb 第2類医薬品 ニキビ治療薬

100mL

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないでください。

目や目の周囲

相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 患部が広範囲の人
 - 湿潤やただれのひどい人
 - 深い傷やひどいやけどの人
 - 硬結(硬いしこり)のある重症の人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- 2週間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
- その他
 - 本剤は傷口があると、しみる、ヒリヒリする等の一過性の刺激があらわれることがあります。刺激が気になる場合は、使用を中止してください。
 - 本剤の使用により、皮膚が多少乾燥したり、赤みがさしたりすることがあります。そのときは使用を一時中止してください。再び使用するときは間隔をあけて使用してください。

【効能・効果】

ニキビ

【用法・用量】

1日2回(朝晩)、コットン、脱脂綿、ガーゼ等に適量を取り、肌にしばらくの間(2~3分間)押し当ててください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- 使用前に腕の内側などに少量を塗布して一晩そのままにしておき、翌朝、塗布部位に過敏症状(発疹・発赤、かゆみ等)があらわれた場合は使用をお避けください。
- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 外用にのみ使用してください。

【成分】

有効成分	分量
イソプロピルメチルフェノール	0.3%
アラントイン	0.2%
サリチル酸	0.5%

添加物として、1,3-ブチレングリコール、エタノール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート20、エデト酸Na、L-アルギニン、クロロブタノール、トリエタノールアミン、ニコチン酸アミド、香料を含有します。

【保管及び取扱上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管してください。
- 小児の手の届かないところに保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。
なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- 冷所に保管すると結晶が析出することがありますので、0℃以下での保管はお避けください。
- 火の近くでの使用および保管はお避けください。
- 衣服、寝具、家具、床等につかないように十分ご注意ください。
(材質によっては落ちにくいことや変色することがある)

お問い合わせ先：お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020/大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

ROHTO **ロート製薬株式会社**
大阪市生野区巽西1-8-1

401755702