

服用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

販売名:パンシロン®アクティブ55 胃腸薬



第3類医薬品

製品の特徴

パンシロン®アクティブ55は年齢などで増える**重たい胃**や、**胃もたれ・胸やけ・不快感**に効く胃腸薬です。

◎3種の消化酵素を補い、消化を助けます。

◎生薬(ケイヒ末)の力で、胃腸を元気に動かします。



薬の配合成分が気になる方におすすめの処方設計

※原薬としてナトリウム・アルミニウム・ロートエキスを配合しておりません。(生薬由来のナトリウム、アルミニウムは含む場合があります。)

塩辛くなく、スーッと爽快な服用感

ご年配の方やお子さま(3才から服用可)にも。



使用上の注意



相談すること

1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1)医師の治療を受けている人
- (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3)次の診断を受けた人

腎臓病、甲状腺機能障害

2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3.2週間位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

■効能・効果

もたれ(胃もたれ)、胃重、消化促進、消化不良による胃部・腹部膨満感、胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、胸つかえ、げっぷ(おくび)、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、飲み過ぎ(過飲)、胃痛、食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ(過食)

■用法・用量

次の量を食後又は食間・就寝前に水又はお湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	1包	3回
11才以上15才未満	2/3包	
8才以上11才未満	1/2包	
5才以上8才未満	1/3包	
3才以上5才未満	1/4包	
3才未満	服用しないこと	

※食間とは…食後2～3時間をさします。

(用法・用量に関連する注意)

(1)用法・用量を厳守してください。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

■成分・分量(3包中)

	有効成分と配合量		作用
消化酵素	ビオチアスターゼ2000	90mg	3大栄養素(でんぷん、たんぱく質、脂肪)に対応する消化酵素で、胃の内容物の消化を助け胃排泄を促進し、胃もたれを改善します。
	プロザイム6	15mg	
	リパーゼAP12	60mg	
健胃剤	チンピ末	200mg	生薬成分がもつ特有の芳香と健胃作用で、胃腸の働きを良好にします。
	コウボク末	200mg	
	ケイヒ末	305mg	
制酸剤	水酸化マグネシウム	500mg	速効性制酸剤で、胃酸をすばやく中和し、胃の不快感を改善します。酸から胃を守ります。
	炭酸マグネシウム	690mg	
	沈降炭酸カルシウム	360mg	
	ボレイ末	150mg	
粘膜修復剤	カンゾウ末	225mg	胃粘膜の血流の低下を防ぎ、荒れた胃粘膜を修復します。

添加物:ℓ-メントール、キシリトール、ハッカ油、香料、軽質無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース

■保管及び取扱上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに保管してください。
- (2)小児の手の届かないところに保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- (5)1包を分けて服用したときの残りは、袋の口を折り返して封をするように閉じ、2日以内に使用してください。

お問い合わせ先:お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00～18:00(土、日、祝日を除く)

ロート製薬株式会社

大阪市生野区巽西1-8-1