



使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

ロトクリニカル 抗菌目薬i 第2類医薬品

眼科用薬

小さなお子さまにも*

今すぐ治したい! ものもらい(麦粒腫)・結膜炎を治す


こんな目の症状に

ものもらい




身の回りにいる細菌がまぶたの脂腺などに入り込み、腫れや炎症を起こします。

けつまくえん 結膜炎(はやり目)



細菌が結膜に感染して起こることが多く、白目が充血したり、目やにが多く出たりします。

がんけんえん 眼瞼炎(まぶたのただれ)



眼瞼炎とは眼瞼(まぶた)周囲の充血、浮腫(腫れ)、熱感を伴う炎症です。

ものもらい(麦粒腫)・結膜炎にすぐ対処! 3つの有効成分^{基準★内}最大濃度配合

抗菌成分 最大濃度配合

スルファメトキサゾールナトリウム4%基準★内最大濃度配合。繁殖する原因菌に抗菌力を発揮。

抗炎症成分 最大濃度配合

グリチルリチン酸二カリウム0.25%基準★内最大濃度配合。効果的に炎症を鎮める。

かゆみ抑制成分 最大濃度配合

抗ヒスタミン作用を持つクロルフェニラミンマレイン酸塩0.03%基準★内最大濃度配合。ガマンできないかゆみを抑制。

★基準とは厚生労働省が承認事務の効率化を図るために定めた医薬品の範囲


さらにこだわりの処方設計

すっきり
とした
さし心地
清涼化剤配合
(L-メントール)

患部に
長く留まる
処方設計
アルギン酸+
ヒプロメロースの
2つの粘稠剤配合

防腐剤
無添加
ベンザルコニウム
塩化物、パラベンを
配合していません

【開け方】




キャップが完全に外れるまで回し続けてください。開封途中でキャップをひっぱらないでください。

※1歳以上

使用上の注意

してはいけないこと

 (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- *1. 次の人は使用しないでください。
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 長期連用しないでください。

相談すること

1. 次の人は、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 次の症状のある人
はげしい目の痛み
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って

医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

*まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック(アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる

3. 3~4日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

効能・効果

ものもらい、結膜炎(はやり目)、目のかゆみ、眼瞼炎(まぶたのただれ)

用法・用量

1回1~3滴、1日5~6回点眼してください。

用法・用量に関連する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。
[目にキズがついたり、二次感染、汚染や異物混入(目やにやホコリ等)の原因となる]また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (4) 点眼用のみ使用してください。



成分

スルファメトキサゾールナトリウム…4%、クロルフェニラミンマレイン酸塩…0.03%、グリチルリチン酸二カリウム…0.25%、イプシロン-アミノカプロン酸…1%

添加物として、ホウ酸、ホウ砂、ヒプロメロース、ポリソルベート80、アルギン酸、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、*l*-メントール、エデト酸Na、pH調節剤を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 未使用分は内袋に戻し、箱に入れ、日光や蛍光灯の当たらない涼しい所に保管してください。品質を保持するため、過度の高温(自動車内や暖房器具の近く等)及び過度の低温(冷蔵庫の中等)を避け、なるべく涼しい所に保存してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、内袋開封後は、保管及び取扱い上の注意に従い、3ヵ月以内を目安にご使用ください。
- (6) 本品は、「1回使いきりタイプ」の点眼剤です。容器には薬液が押し出しやすいようにやや多く入っていますが、一度開封したものは液が残っていても必ず捨ててください。
- (7) ズボンの後ろポケット等に製品を入れると、キャップが開くことがありますのでご注意ください。

※点眼により口中に苦味を感じるがありますが、薬液が涙道を通して流れでてくるため、無害ですから心配ありません。

お問合せ先

コミュニケーションコール

0120-610-755

受付時間/9:00~17:00(土、日、祝除く)

ロート製薬株式会社

大阪市生野区巽西1-8-1