

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

# 水虫・たむし用薬 1日1回 ラミシールDX

第②類医薬品

殺真菌成分 テルビナフィン塩酸塩配合

いんきんたむし・ぜにたむしは白癬菌というカビ（真菌）が皮膚表面にある角質層に感染・寄生しておきる皮膚病です。ラミシールDXは、殺真菌成分テルビナフィン塩酸塩を配合するいんきんたむし・ぜにたむし治療薬です。

## 特 徴

- 有効成分である「テルビナフィン塩酸塩」の優れた殺真菌作用と角質層への浸透力は、1日1回の塗布で薬剤が患部に留まり、かゆみや痛みなどを引き起こすいんきんたむし・ぜにたむしに持続的に効果を発揮し、症状を治していきます。
- クロタミトンが患部の不快なかゆみを鎮めます。
- グリチルレチン酸が患部の炎症を抑えます。
- l-メントールが爽やかな使用感を与えます。
- 尿素がいんきんたむし・ぜにたむしによる皮膚のかさかさ、ひび割れを改善します。また、角質を柔らかくし、薬剤の浸透を助けます。
- べとつかない、サラッとした使いごこちのよいクリームです。



## 使用上の注意



## してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

### 1. 次の人は使用しないでください

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状（例えば、発疹・発赤、かゆみ、はれ等）を起こしたことがある人

### 2. 次の部位には使用しないでください

- （1）目や目の周囲、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、膣等）、陰のう、外陰部等
- （2）湿疹
- （3）湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部



## 相談すること

### 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- （1）医師の治療を受けている人
- （2）妊婦又は妊娠している可能性のある人
- （3）乳幼児
- （4）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- （5）患部が顔面又は広範囲の人
- （6）患部が化膿している人
- （7）「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人  
（陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。）

### 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症状                                                                                                             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 皮膚   | かぶれ、刺激感、熱感、 <small>りんせつ らくせつ</small> 鱗屑・落屑（フケ、アカのような皮ふのはがれ）、ただれ、乾燥・つっぱり感、皮膚の亀裂、いたみ、色素沈着、発疹・発赤*、かゆみ*、はれ*、じんましん* |

\*：全身に発現することがあります。

### 3. 2週間位使用しても症状が良くならない場合や、本剤の使用により症状が悪化した場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

いんきんたむし、ぜにたむし、みずむし

用法・用量

1日1回、適量を患部に塗布してください。

【用法・用量に関する注意】

- 定められた用法を厳守してください。
- 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- 本剤のついた手で、目や粘膜にふれないでください。
- 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 外用にのみ使用してください。

<チューブの穴の開け方>
 キャップを逆さにして、突起部をチューブの先に強く押し当てて開けてください。

成 分（100g中）

| 成分         | 分量   | はたらき                                                       |
|------------|------|------------------------------------------------------------|
| テルビナフィン塩酸塩 | 1g   | いんきんたむし・ぜにたむしの原因である白癬菌にすぐれた殺真菌作用を示します。                     |
| クロタミトン     | 5g   | 患部のかゆみを鎮めます。                                               |
| グリチルレチン酸   | 0.5g | 患部の炎症を抑えます。                                                |
| l-メントール    | 2g   | 患部のかゆみを鎮め、爽やかな使用感が残ります。                                    |
| 尿素         | 5g   | いんきんたむし、ぜにたむしによる皮ふのかさかさ、ひび割れを改善します。また、角質を柔らかくし、薬剤の浸透を助けます。 |

添加物：N-メチル-2-ピロリドン、オクチルドデカノール、グリセリン、カルボキシビニルポリマー、ステアリン酸グリセリン、ステアリン酸ポリオキシル、ジイソプロパノールアミン、pH調節剤

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。）。
- 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

いんきんたむし、ぜにたむしの治療のアドバイス

いんきんたむし・ぜにたむしの原因である白癬菌は、症状があらわれている範囲より広く寄生していることが多いので、薬剤を広めに塗布することをお勧めします。また、以下のことに留意して使用してください。

**1.根気よく継続治療する**

●かゆみなどの症状がなくなった後も、約1ヵ月間は、根気よく治療を続けてください。

**2.患部を清潔にする**

●白癬菌の増殖を抑え、二次感染を防ぐため、患部をよく洗い清潔に保ってください。

●薬剤を塗布した後、患部にふれた手や指もしっかり洗ってください。

**3.患部の乾燥に心がける**

●白癬菌はじめじめした環境を好みます。入浴あとや、スポーツなどで汗をかいたあとはしっかり患部を乾燥させてください。

●通気性の悪い服装はなるべく避け、患部を乾燥させるよう心がけてください。

**4.バスタオルなども清潔に**

●バスタオルなどは清潔に保ち、感染に注意してください。

●バスタオルなどを共用しないようにしてください。

【お問い合わせ先】

- お買い求めのお店
- 全薬お客様相談室  
電 話：03(4476)8030  
受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

製造販売元

全薬工業株式会社

東京都文京区大塚5-6-15

<https://www.zenyaku.co.jp>