

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

ビタミンB₁主薬製剤

チアビタミン錠 B

チアビタミン錠 Bは、1日量1錠中に神経・筋肉系に作用するビタミンB₁を100mg配合し、「シュガーレス」（砂糖を含まない）であることから糖類を気にされる方も服用いただけます。

チアビタミン錠 Bは、吸収、体内利用の良いビタミンB₁誘導体（フルスルチアミン）を使用し、肩こり、便秘、眼精疲労、神経痛、筋肉痛の緩和に、肉体疲労時や老年期のビタミンB₁の補給に、また脚気に効果があります。ビタミンB₁の他、ビタミンE、B₂、B₆、 γ -オリザノールを配合しています。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

薬などによりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、口内炎

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

軟便、下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛（肩・腰・肘・膝痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、便秘、眼精疲労（慢性的な目の疲れ及びそれに伴う目のかすみ・目の奥の痛み）

脚 気

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」

次の場合のビタミンB₁の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

裏面もお読みください。

用法・用量

次の量を水又はぬるま湯で服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人（15歳以上）	1 錠	1 回
15歳未満	服用しないでください	

＜用法・用量に関連する注意＞

(1) 用法・用量を厳守してください。

成分・分量

1 錠（成人の1日服用量）中

成 分	含 量
フルスルチアミン塩酸塩（ビタミンB ₁ 誘導体） （フルスルチアミンとして）	109mg 100mg）
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB ₆ ）	15mg
リボフラビン（ビタミンB ₂ ）	12mg
γ-オリザノール	10mg
トコフェロールコハク酸エステルカルシウム （ビタミンEコハク酸エステルカルシウム） （dl-α-トコフェロールコハク酸エステルとして）	30mg 29mg）

添加物：セルロース、D-マンニトール、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスカルメロースNa、ポビドン、無水ケイ酸、タルク、ステアリン酸Mg、ポリビニルアルコール（部分けん化物）、ヒプロメロース、クエン酸トリエチル、酸化チタン、黄色4号（タートラジン）、カルナウバロウ

＜成分・分量に関連する注意＞

本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、これは本剤に含まれるビタミンB₂（リボフラビン）によるものです。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

- (1) 本製品の購入先
- (2) 佐藤薬品工業株式会社 医薬情報部
TEL 0744-28-0021
受付時間 9:00～16:30（土・日・祝日を除く）

製造販売元



佐藤薬品工業株式会社
奈良県橿原市観音寺町9番地の2