

第3類医薬品

外用湿疹・皮膚炎用薬

日本薬局方

チンク油

Zinc Oxide Oil

小範囲の湿疹・皮膚炎、
やけどによる潮紅に

発売元

健栄製薬株式会社

大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5626

製造販売元

日興製薬株式会社

岐阜県羽島市江吉良町 1593

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。

また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。



使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

ひどい又は広範囲のやけど

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 湿潤やただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能効果】

小範囲の湿疹・皮膚炎、やけどによる潮紅

【用法用量】

1日1～数回、適量を直接患部に塗布してください。

＜用法用量に関連する注意＞

- (1) 用法用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

【成分分量】 100g中

酸化亜鉛 50g含有

添加物：ヒマシ油、ダイズ油

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

＜貯法＞

気密容器。室温保存。

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)