

日本薬局方
消毒用エタノール

第3類
医薬品

matsu
kiyo

D

折りたたんで
廃棄しやすい
ボトルを採用

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

Ethanol for Disinfection

日本薬局方

消毒用
エタノール

殺菌消毒薬

- ・本液を脱脂綿ガーゼ等に浸して患部に軽く塗ってください。

※この商品は(株)マツモトキヨシホールディングスの
オリジナル商品です。

アルコール類
水溶性
危険等級 II
火気厳禁

折り目

第3類医薬品

日本薬局方 消毒用エタノール

第3類
医薬品

使用に際しては、説明書きをよく読んでください。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

粘膜(口唇等)、目の周囲

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 患部が広範囲の人。
- (4) 深い傷やひどいやけどの人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、灼熱感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能効果〕 創傷面の殺菌・消毒

〔用法用量〕 本液を脱脂綿、ガーゼ等に浸して患部に軽く塗ってください。

(右側面へ続く➤)

折り目

日本薬局方 消毒用エタノール

第3類
医薬品

(➤左側面より続く)

〔用法用量に関連する注意〕

- (1) 用法用量を厳守してください。
- (2) 局所刺激作用があるので、軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して患部に貼付しないでください。
- (3) 過度に使用すると、脱脂等による皮ふ荒れを起こすことがあります。
- (4) 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意してください。
- (5) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (6) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (7) 外用にのみ使用してください。

〔成分分量〕

エタノール(C_2H_6O) 76.9～81.4vol%を含有します。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (6) 開封時、容器の肩部又は底部をもち、液がとびださないように、キャップを開けてください。
- (7) 薬剤が床や家具等に付着しないようにしてください。(変質又は変色のおそれがあります。)

〔貯法〕

気密容器。遮光して、火気を避けて室温保存。



製造販売元

健栄製薬株式会社

大阪府中央区伏見町2丁目5番8号

電話番号 06(6231)5626