

日本薬局方
消毒用エタノール

第3類
医薬品

折りたたんで
廃棄しやすい
ボトルを採用

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

※この商品は(株)マツキヨココカラ&カンパニー
のオリジナル商品です。

アルコール類
水溶性
危険等級Ⅱ
火気厳禁

B

Ethanol for Disinfection
Sterilizing Disinfectants

日本薬局方 消毒用エタノール 第3類医薬品

使用に際しては、説明書きをよく読んでください。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

粘膜(口唇等)、目の周囲

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 患部が広範囲の人。
- (4) 深い傷やひどいやけどの人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、灼熱感

3. 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能効果】

創傷面の殺菌・消毒

【用法用量】

本液を脱脂綿、ガーゼ等に浸して患部に軽く塗ってください。

(右側面へ続くノ)

日本薬局方
消毒用エタノール

第3類
医薬品

(ノ左側面より続く)

〈用法用量に関連する注意〉

- (1) 用法用量を厳守してください。
- (2) 局所刺激作用があるので、軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して患部に貼付しないでください。
- (3) 過度に使用すると、脱脂等による皮ふ荒れを起こすことがあります。
- (4) 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意してください。
- (5) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (6) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (7) 外用にのみ使用してください。

【成分分量】

エタノール(C₂H₆O) 76.9~81.4 vol%を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (6) 開封時、容器の肩部又は底部をもち、液がとびださないように、キャップを開けてください。
- (7) 薬剤が床や家具等に付着しないようにしてください。(変質又は変色のおそれがあります。)

〈貯法〉

気密容器。遮光して、火気を避けて室温保存。

製造販売元：健栄製薬株式会社
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5822
受付時間 9:00~17:00
(土日祝日・年末年始・夏季など特別休業日を除く)

400

300

200

100