

〔効能効果〕きずの消毒・洗浄

〔用法用量〕そのままの液又は2～3倍に水でうすめた液を脱脂綿、ガーゼ等に浸して患部を洗ってください。

〈用法用量に関連する注意〉(1)用法用量を厳守してください。(2)顔面など皮膚の敏感な個所に適用する場合には、はじめは低濃度から開始してください。(3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(4)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(5)外用にのみ使用してください。

〔成分分量〕過酸化水素(H_2O_2)2.5～3.5w/v%を含有します。

添加物:フェナセチン、リン酸

〔保管及び取扱い上の注意〕(1)直射日光の当たらない冷所(30℃以下)に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。(5)保存中に瓶内の圧力が高くなっていることがありますので、瓶口を顔にむけぬようにして、キャップをあけてください。

〈貯法〉気密容器。遮光して30℃以下で保存。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

※この商品は(株)マツキョココカラ&カンパニーのオリジナル商品です。

製造販売元:健栄製薬株式会社

大阪府中央区伏見町2丁目5番8号

電話番号 06(6231)5822

受付時間 9:00～17:00(土日祝日・年

末年始・夏季など特別休業日を除く)

matsu
kiyo

Oxydol

日本薬局方

オキシドール

外用殺菌消毒薬

・きずの消毒、洗浄に

第3類医薬品

Oxydol (Hydrogen Peroxide)

Disinfectant containing approximately 3% hydrogen peroxide.
Use to disinfect and clean cuts and scratches.

使用に際しては、説明書きをよく読んでください。

△ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1)医師の治療を受けている人。(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3)患部が広範囲の人。(4)深い傷やひどいやけどの人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

