

■消毒用エタノールIP「ケンエー」500mL（スプレー式）のつけかえ用としてもご使用いただけます。

※必ず消毒用エタノールIP「ケンエー」500mL（スプレー式）のスプレーポンプをつけかえてください。

※スプレーポンプを装着する際は、容器に残っているリングを必ず取り除いてください。リングが付いたままスプレーポンプを装着すると、液漏れやスプレーが正常に作動しなくなるおそれがあります。

※つけかえ時は液はねや液だれに注意してください。



折りたたんで廃棄しやすいボトルを採用

健栄製薬(株)お問い合わせ先  
電話番号(06)6231-5822  
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

折り目

消毒薬

第3類医薬品

# 消毒用エタノールIP<sup>ケン</sup>

アルコール類 \* 水溶性 \* 危険等級II \* 火気厳禁



健栄製薬株式会社  
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号

手指・皮膚、  
医療機器の消毒に

使用に際しては、説明書きをよく読んでください。

消毒用エタノールIP「ケンエー」第3類医薬品

## ⚠ 使用上の注意

### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

- (1) 損傷のある皮膚。
- (2) 目の周囲、粘膜等。

### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、灼熱感

### 【効能効果】

手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

### 【用法用量】

塗擦又はガーゼ、脱脂綿等に浸して清拭してください。

(右側面へ続く)

折り目

(ノ左側面より続く)

〈用法用量に関連する注意〉

- (1) 用法用量を厳守してください。
- (2) 局所刺激作用があるので、軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して貼付しないでください。
- (3) 過度に使用すると、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあります。
- (4) 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意してください。
- (5) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (6) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (7) 外用にのみ使用してください。

### 【成分分量】

エタノール(C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>O) 76.9~81.4 vol%を含有します。添加物としてイソプロパノールを含有します。

〈成分に関連する注意〉

アレルギーテストの検査を受ける場合には、本剤を使用していることを医師に知らせてください。(アレルギーテストの検査値に影響をおよぼすことがあります。)

### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (6) 開封時、容器の肩部又は底部をもち、液がとびださないように、キャップを開けてください。
- (7) 薬剤が床や家具等に付着しないようにしてください。(変質又は変色のおそれがあります。)

〈貯法〉

気密容器。遮光して、火気を避けて室温保存。

400

300

200

100