

P

第3類医薬品

眼科用剤

結 晶

日本薬局方

ホウ酸

Boric Acid

外用剤なので飲まないでください

結膜囊の洗浄・消毒に



ケンエー

健栄製薬株式会社

大阪府中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5626

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

第3類医薬品

結晶

眼科用剤

日本薬局方

ホウ酸

Boric Acid

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 外用にのみ使用し、内服しないでください
2. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 次の症状のある人。

はげしい目の痛み

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

第3類医薬品

結晶

眼科用剤

日本薬局方

ホウ酸

Boric Acid

〔効能効果〕 結膜囊の洗浄・消毒

〔用法用量〕 2%以下の濃度で用いてください。

〈用法用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (3) 混濁したものは使用しないでください。
- (4) 眼科用にのみ使用してください。
- (5) 完全に溶解させてから使用してください。

〔成分分量〕 1g中 日局ホウ酸 1g含有。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (5) 溶かした後は速やかに使用してください。

〈貯法〉 密閉容器。室温保存。

〔希釈方法〕

2%液：添付のスプーン1杯(約1g)を水約50mLに溶かしてください。

※添付のスプーン1杯は約1gです。

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)