

消毒用 エタノールIP「ケンエー」

第3類
医薬品

■消毒用エタノールIP「ケンエー」500mL
(スプレー式)のつけかえ用としてもご使用いただけます。

※必ず消毒用エタノールIP「ケンエー」500mL(スプレー式)のスプレーポンプをつけかえてください。

※スプレーポンプを装着する際は、容器に残っているリングを必ず取り除いてください。リングが付いたままスプレーポンプを装着すると、液漏れやスプレーが正常に作動しなくなるおそれがあります。

※つけかえ時は液はねや液だれに注意してください。



折りたたんで廃棄し
やすいボトルを採用

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元：健栄製薬株式会社
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5822
受付時間 9:00~17:00
(土日祝日・年末年始・夏季など特別休業日を除く)
※この商品は(株)マツキヨココカラ&カンパニー
のオリジナル商品です。

アルコール類
水溶性
危険等級Ⅱ
火気厳禁

B

Disinfectant
For disinfecting hands, skin, and medical equipment.
This product can also be used as a refill for
the "Ethanol IP Kenei for Disinfection" spray (500 ml).

消毒用エタノールIP「ケンエー」

第3類医薬品

使用に際しては、説明書をよく読んでください。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

- (1)損傷のある皮膚。
- (2)目の周囲、粘膜等。

相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、灼熱感

【効能効果】

手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

【用法用量】

塗擦又はガーゼ、脱脂綿等に浸して清拭してください。

(右側面へ続く)

消毒用 エタノールIP「ケンエー」

第3類
医薬品

(ノ左側面より続く)

〈用法用量に関連する注意〉

- (1)用法用量を厳守してください。
- (2)局所刺激作用があるので、軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して貼付しないでください。
- (3)過度に使用すると、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあります。
- (4)広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意してください。
- (5)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (6)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (7)外用にのみ使用してください。

【成分分量】

エタノール(C₂H₅O)76.9~81.4vol%を含有します。
添加物としてイソプロパノールを含有します。

〈成分に関連する注意〉

アレルギーテストの検査を受ける場合には、本剤を使用していることを医師に知らせてください。(アレルギーテストの検査値に影響をおよぼすことがあります。)

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)火気に近づけないでください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (6)開封時、容器の肩部又は底部をもち、液がとびださないように、キャップを開けてください。
- (7)薬剤が床、家具、革製品、大理石や一部の宝石等に付着しないようにしてください。(変質又は変色のおそれがあります。)

〈貯法〉

気密容器。遮光して、火気を避けて室温保存。

400

300

200

100