

matsu
kiyo

1日数回うがい

Povidone-Iodine Gargle
ケンエーうがい薬S

細菌、真菌、ウイルス
などを殺菌、消毒

うがい薬



薬のはたらき

口腔内の殺菌・消毒

のどの殺菌・消毒

口臭の除去

ポビドンヨード:7.0g
/100mL 中

・細菌、真菌、ウイルス
などの微生物に殺
菌・消毒効果がある

含嗽薬

第3類医薬品

ご使用に際して、外箱の説明文を
必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に
保存してください。

販売名: ケンエーうがい薬S 第3類
医薬品

ケンエーうがい薬Sは、各種の
細菌、真菌、ウイルスなどの微
生物に迅速な殺菌・消毒効果があるポビドンヨ
ードを配合したうがい薬で、口腔内及びのどの
殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去にすぐれた効果
を発揮します。

⚠ 使用上の注意

【してはいけないこと】 (守らないと現在の症状が悪
化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の人は使用しないでください
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こし
たことがある人。

【相談すること】 1. 次の人は使用前に医師、歯科医
師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 口内のひどいただれのある人。
(3) 甲状腺機能障害の診断を受けた人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可
能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱
を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者
に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消 化 器	吐き気
そ の 他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラ キシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、 のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意 識の混濁等があらわれる。

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は
使用を中止し、この外箱を持って医師、歯科医師、
薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能効果】

口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

※この商品は(株)マツモトキヨシホールディングス
のオリジナル商品です。

【用法用量】

1回、本剤2～4mLを水約60mLに薄めて、1日数
回うがいしてください。

【用法用量に関連する注意】

- (1) 用法用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督の
もとに使用させてください。
- (3) うがい用にのみ使用してください。
- (4) 使用のつど希釈し、希釈後は早目に使用してください。

【成分分量】 100mL 中

ポビドンヨード7.0g (有効ヨウ素700mg) 含有
添加物: エタノール、l-メントール、サッカリンNa
水和物、プロピレングリコール、香料

【成分分量に関連する注意】

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料 (義歯等)
が変色することがあります。

【保管及び取扱い上の注意】


- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管し
てください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原
因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 衣類等に付着したときは、すぐに水で洗い流して
ください。

【使用法】 添付の計量カップを斜めに
して本剤を2～4目盛のところまで入
れ、水を60の目盛まで加えて薄めてか
らうがいしてください。

60 mL

上の目盛
までが4 mL

下の目盛までが2 mL



副作用被害救済制度の問合せ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造販売元: 健栄製薬株式会社
大阪府中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5822
受付時間 9:00～17:00
(土日祝日・年末年始・夏季など特別休業日を除く)