

matsu
kiyo

Povidone-Iodine Gargle ケンエーうがい薬S

細菌、真菌、ウイルス
などを殺菌、消毒

うがい薬

第3類医薬品

Povidone-Iodine Gargle

For disinfection and sanitization of bacteria, fungi, viruses, and other germs

販売名:ケンエーうがい薬S

第3類
医薬品

ケンエーうがい薬Sは、各種の細菌、真菌、ウイルスなどの微生物に迅速な殺菌・消毒効果があるポビドンヨードを配合したうがい薬で、口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去にすぐれた効果を発揮します

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は使用しないでください

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人

相談すること 1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

●薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
●口内のひどいただれのある人 ●甲状腺機能障害の診断を受けた人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります
その場合は直ちに医師の診療を受けてください

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能効果】

口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

【用法用量】

1 回、本剤 2～4 mLを水約 60 mL に薄めて、1 日数回うがいしてください

【用法用量に関連する注意】

●用法用量を厳守してください ●小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください ●うがい用にのみ使用してください ●使用のつど希釈し、希釈後は早目に使用してください

【使用法】

添付の計量カップを斜めにして本剤を 2～4 目盛のところまで入れ、水を 60 の目盛まで加えて薄めてからうがいしてください

60mL
上の目盛
までが 4 mL
.....
下の目盛
までが 2 mL



【成分分量】 100 mL 中

ポビドンヨード 7.0 g (有効ヨウ素 700 mg) 含有
添加物: エタノール、l-メントール、サッカリン Na 水和物、プロピレングリコール、香料

【成分分量に関連する注意】

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがあります

【保管及び取扱い上の注意】

●直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください ●小児の手の届かない所に保管してください ●他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります) ●衣類等に付着したときは、すぐに水で洗い流してください

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

※この商品は株式会社マツキヨココカラ&カンパニーのオリジナル商品です。

製造販売元: 健栄製薬株式会社
大阪府中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5822
受付時間 9:00~17:00
(土日祝日・年末年始・夏季など特別休業日を除く)