

matsu
kiyo

Boric Acid

日本薬局方

ホウ酸

眼科用剤

・結膜囊の洗浄・消毒に

外用剤なので飲ま
ないでください

第3類医薬品

Boric Acid

For cleaning and disinfecting the conjunctival sac.

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

眼科用剤

日本薬局方

ホウ酸

第3類医薬品

結膜囊の洗浄・消毒に

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、
副作用が起こりやすくなります)

1. 外用にのみ使用し、内服しないで
ください
2. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又
は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起
こしたことがある人。
(3) 次の症状のある人。
はげしい目の痛み
2. 使用後、次の症状があらわれた場
合は副作用の可能性があるので、
直ちに使用を中止し、この外箱を
持って医師、薬剤師又は登録販売
者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

〔効能効果〕 結膜囊の洗浄・消毒

〔用法用量〕

2%以下の濃度で用いてください。

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931

〈用法用量に関連する注意〉

(1) 小児に使用させる場合には、保護
者の指導監督のもとに使用させてく
ださい。(2) コンタクトレンズを装着し
たまま使用しないでください。(3) 混
濁したものは使用しないでください。
(4) 眼科用にのみ使用してください。
(5) 完全に溶解させてから使用してく
ださい。

〔成分分量〕

1包中 日局ホウ酸 3g含有。

〔保管及び取扱い上の注意〕

(1) 直射日光の当たらない湿気の少な
い涼しい所に保管してください。(2)
小児の手の届かない所に保管してく
ださい。(3) 他の容器に入れ替えない
でください。(誤用の原因になったり品
質が変わることがあります。)(4) 使
用期限を過ぎた製品は使用しないで
ください。(5) 溶かした後は速やかに
使用してください。

〔貯法〕 密閉容器。室温保存。

〔希釈方法〕

2%液：本品1包(3g)をとり、水
約150mLに溶かしてください。

製造販売元：健栄製薬株式会社
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号

電話番号 06(6231)5822

受付時間 9:00~17:00

(土日祝日・年末年始・夏季など
特別休業日を除く)

※この商品は(株)マツキヨココカラ&カンパニーのオリジナル商品です。