

のど
ダブル
ケア
お口

うがい以外に使用しないでください

押して
あける

健栄うがい薬P

第3類医薬品

健栄 うがい薬P

ほんのりフル～ティ～

後味さわやか



©meiji ad

**ウイルス・細菌・真菌
殺菌・消毒**

第3類医薬品

計量
カップ付

のどとお口の
Wケア!!
元気で健康に

のど
ダブル
ケア
お口

のどケア

のどの奥まで
「ガラガラうがい」

のどの奥までうがい液が届く「ガラガラ
うがい」で、のどに付いたウイルス・細菌・真菌を、迅速に殺菌・消毒します。



お口ケア

お口の中を
「クチュクチュうがい」

のどの手前の歯と歯茎、舌など口腔内を
清潔にする「クチュクチュうがい」で、口腔
内に繁殖する細菌・真菌などを殺菌・
消毒して、口臭を除去します。



ご使用に際して、この箱の説明文を必ずお読
みください。また、必要な時に読めるよう、この
箱は保存しておいてください。

△使用上の注意

してはいけないこと (守らないと現在の症
状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を
起こしたことがある人は使用しないこと。

相談すること ①次の人は使用前に医師、歯
科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
(1)薬などによりアレルギー症状を起こしたこ
とがある人。(2)口内のひどいただれのある人。
(3)甲状腺機能障害の診断を受けた人。②使用
後、次の症状があらわれた場合は副作用の可
能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱
を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販
売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィ ラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、 じんましん、声のかすれ、くしゃみ、 のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、 意識の混濁等があらわれる。

③5～6日間使用しても症状がよくならない場
合は使用を中止し、この箱を持って医師、歯
科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

健栄製薬(株)お問い合わせ先
電話番号(06)6231-5822
受付時間9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 電話:0120-149-931

特徴 健栄うがい薬の効きめはそのまま、ほん
のりフル～ティ～な香りのうがい薬です。

成分・分量 1mL中
ポビドンヨード 70mg(有効ヨウ素として7mg)
●添加物として、エタノール、l-メントール、クエン
酸、リン酸水素Na、サッカリンNa、pH調整剤、
香料、ベンジルアルコール、バニリン、安息香酸
ベンジルを含有します。

【成分・分量に関連する注意】本剤の使用により、銀
を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがある。

効能・効果
口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

用法・用量
1回、本剤2～4mLを水約60mLにうすめて、
1日数回うがいしてください。

【用法・用量に関連する注意】(1)小児に使用させ
る場合には、保護者の指導監督のもとに使用させ
ること。(2)本剤はうがい用だけに使用し、キズや
やけどへの使用や、内服はしないこと。(3)目に入ら
ないように注意すること。万一、目に入った場合
には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、
症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
(4)本剤は使用する時にうすめて、早めに使用する
こと。(5)定められた用法、用量を厳守すること。

保管及び取扱い上の注意
(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管
すること。(2)小児の手の届かない所に保管するこ
と。(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因
になったり品質が変わることがある)。(4)衣服等に
付着すると着色するので注意すること。なお、付着
した場合にはすぐに水でよく洗い落とすこと。(5)使
用期限を過ぎた製品は使用しないこと。