

のどの 痛み・はれ

口腔内の殺菌・消毒に



©meiji ad

アズレンE トローチ



3つの有効成分

アズレンスルホン酸
ナトリウム水和物

抗炎症

グリチルリチン酸
二カリウム

抗炎症

セチルピリジニウム
塩化物水和物

殺菌

第3類医薬品

販売名：アズレンEトローチ 第3類医薬品

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

⚠ 使用上の注意

相談すること

- 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能効果】

のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・
のどの痛み・のどのはれ、口腔内の殺菌・消毒、口臭の
除去

【用法用量】

次の量を口中に含み、かまずにゆっくり溶かしてください。

年齢	1回量	1日使用回数
15歳以上	1錠	4～6回
5歳以上 15歳未満		2～3回
5歳未満	使用しないでください	

〈用法用量に関連する注意〉

- (1) 用法用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) かみ砕いたり、のみ込んだりしないでください。
- (4) トローチの取り出し方 下図のようにトローチの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して使用してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)

〈PTPシートの取り出し図〉



【成分分量】

6錠中 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物4.8mg、
グリチルリチン酸二カリウム15mg、セチルピリジニ
ウム塩化物水和物6mg含有
添加物：ステアリン酸、ステアリン酸マグネシウム、
L-メントール、ゼラチン、白糖、パラオキシ安息香
酸メチル、エタノール、エチルバニリン、バニリン、
プロピレングリコール、香料

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に箱に入れて保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。(5) アルミ袋を開封した後は、品質保持の点からなるべく早く使用してください。(6) PTPのアルミ箔が破れたり、トローチが破損しないよう保管及び携帯に注意してください。

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931