

P

指定医薬部外品

あかぎれ用薬

グリセリンカリ液P「ケンエー」

(ベルツ水)

Glycerin and Potash
Solution P「Kenei」

ひび、あかぎれに

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

グリセリンカリ液P「ケンエー」

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください
湿潤やただれのひどい人。
2. 次の部位には使用しないでください
粘膜、傷口、炎症部位。
3. 長期連用しないでください




相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談してください
使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	刺激感、発赤、かゆみ



青キャップをとり
瓶を倒立し、容器
を軽くおさえ、必
要量をおし出して
使用してください。

【効能効果】 ひび、あかぎれ

【用法用量】 そのまま適量を患部に塗布してください。

〈用法用量に関連する注意〉

- (1) 用法用量を厳守してください。
- (2) 皮ふに塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して患部に貼付しないでください。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (5) 外用にのみ使用してください。

【成分分量】 100 mL中

水酸化カリウム 0.3 g、グリセリン 20 mL含有
添加物：エタノール、フェニルエチルアルコール、香料

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

〈貯法〉

気密容器。火気を避けて室温保存。