

P

あかぎれ用薬

指定医薬部外品

グリセリンカリ液^{P「ケンエー」}

(ベルツ水)

第二石油類 * 水溶性 * 危険等級Ⅲ * 火気厳禁

Glycerin and Potash
Solution P「Kenei」



ケンエー

健栄製薬株式会社

大阪府中央区伏見町2丁目5番8号

電話番号 06(6231)5626

ひび、あかぎれに

使用に際しては、説明書をよく読んでください。

グリセリンカリ液P「ケンエー」



使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

湿潤やただれのひどい人。

2. 次の部位には使用しないでください

粘膜、傷口、炎症部位。

3. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。

(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って

医師又は薬剤師に相談してください

使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	刺激感、発赤、かゆみ

〔効能効果〕 ひび、あかぎれ

〔用法用量〕 そのまま適量を患部に塗布してください。

〈用法用量に関連する注意〉

- (1) 用法用量を厳守してください。
- (2) 皮ふに塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して患部に貼付しないでください。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 目に入らないように注意してください。
万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (5) 外用にのみ使用してください。

〔成分分量〕 100 mL中

水酸化カリウム0.3 g、グリセリン20 mL
含有

添加物：エタノール、フェニルエチルアルコール、香料

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

〈貯法〉

気密容器。火気を避けて室温保存。

つぶして廃棄
しやすい
減容ボトル