

第2類医薬品

漢方製剤

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。  
また必要な時に読めるように大切に保管してください。

# 二日酔 むかつきに

販売名 茵陳五苓散エキス細粒G「コタロー」

商品番号  
Q052

口が渴き、尿量が減り、吐いたり、むくんだりする。そのような時に応用されるのがこのお薬です。

お酒の飲み過ぎによる二日酔、むかつき、むくみのほか、皮膚にあらわれるじんましんにも効果があります。



## 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください

生後3カ月未満の乳児。



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 1カ月位（嘔吐、二日酔に服用する場合には5~6回）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

## 【効能・効果】

体力中等度以上をめやすとして、のどが渴いて、尿量が少ないものの次の諸症：  
二日酔、嘔吐、むくみ、じんましん

## 【用法・用量】

食前または食間に服用してください。  
食間とは……食後2～3時間を指します。

年齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	1包	3回
15歳未満7歳以上	2/3包	
7歳未満4歳以上	1/2包	
4歳未満2歳以上	1/3包	
2歳未満	1/4包	

## 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

## 【成分・分量】


成分・分量 本剤3包（4.5g）中

タクシャ……………4.8g チョレイ……………3.6g ケイヒ……………2.4g  
ブクリョウ……………3.6g ビャクジュツ……………3.6g インチンコウ……………3.2g  
より抽出した水製エキス3.40gを含有しています。

添加物として含水二酸化ケイ素、ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプンを含有しています。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4) 水分が付きますと、品質の劣化をまねきますので、誤って水滴を落したり、ぬれた手で触れないでください。
- (5) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (6) 使用期限を過ぎた商品は服用しないでください。
- (7) 箱の「開封年月日」記入欄に、箱を開封した日付を記入してください。



本剤は生薬を原料としていますので、商品により多少色が異なることがあります、品質・効果に変わりはありません。

商品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室

大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106

受付時間 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/>  
フリーダイヤル0120(149)931

製造販売元 小太郎漢方製薬株式会社  
〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号