第２類医薬品

漢方製剤

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるように大切に保管してください。

二日酔 むかつきに

商品番号
Q052

販売名　茵蔯五苓散エキス細粒G「コタロー」

口が渇き、尿量が減り、吐いたり、むくんだりする。そのような時に応用されるのがこのお薬です。

お酒の飲み過ぎによる二日酔、むかつき、むくみのほか、皮膚にあらわれるじんましんにも効果があります。

使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

次の人は服用しないでください

生後３ヵ月未満の乳児。

相談すること

1．次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

⑴医師の治療を受けている人。

⑵妊婦または妊娠していると思われる人。

⑶今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2．服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮　膚	発疹・発赤、かゆみ

3．１ヵ月位（嘔吐、二日酔に服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

【効能・効果】

体力中等度以上をめやすとして、のどが渇いて、尿量が少ないものの次の諸症：
二日酔、嘔吐、むくみ、じんましん

（裏面につづく）

【用法・用量】

食前または食間に服用してください。

食間とは……食後2～3時間を指します。

年　　齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	1包	3回
15歳未満7歳以上	2/3包	
7歳未満4歳以上	1/2包	
4歳未満2歳以上	1/3包	
2歳未満	1/4包	

〈用法・用量に関連する注意〉

⑴小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

⑵1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

【成分・分量】

成分・分量　本剤3包（4.5g）中		
タクシャ…… 4.8g	チョレイ…… 3.6g	ケイヒ…… 2.4g
ブクリョウ…… 3.6g	ビャクジュツ…… 3.6g	インチンコウ…… 3.2g
より抽出した水製エキス3.40gを含有しています。		

添加物として含水二酸化ケイ素、ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプンを含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

⑴直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

⑵小児の手の届かない所に保管してください。

⑶他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）

⑷水分が付きますと、品質の劣化をまねきますので、誤って水滴を落したり、ぬれた手で触れないでください。

⑸1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

⑹使用期限を過ぎた商品は服用しないでください。

⑺箱の「開封年月日」記入欄に、箱を開封した日付を記入してください。

本剤は生薬を原料としていますので、商品により多少色が異なることがありますが、品質・効果に変わりはありません。

商品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。
小太郎漢方製薬株式会社　医薬事業部　お客様相談室
大阪市北区中津2丁目5番23号　TEL06(6371)9106
受付時間　9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/
フリーダイヤル0120(149)931

製造販売元　小太郎漢方製薬株式会社
〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号

A3091