

第2類医薬品

漢方製剤

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。  
また必要な時に読めるように大切に保管してください。

# 慢性頭痛に

販売名 清上蠲痛湯エキス細粒G「コタロー」

商品番号

Q157

日常生活の中で困るのが頭痛です。慢性化すると表情まで暗くなり、厄介なものです。そのような時に応用されるのがこのお薬です。

痛みを緩和させる作用が強く、繰り返す頭痛に効果があります。



## 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください

生後3ヵ月未満の乳児。



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

(1)医師の治療を受けている人。

(2)妊婦または妊娠していると思われる人。

(3)胃腸の弱い人。

(4)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

## 【効能・効果】

体力に関わらず使用でき、慢性化した痛みのあるものの次の諸症：

頭痛、顔面痛

## 【用法・用量】

食前または食間に服用してください。  
食間とは……食後2～3時間を指します。

年齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	1包	3回
15歳未満7歳以上	2/3包	
7歳未満4歳以上	1/2包	
4歳未満2歳以上	1/3包	
2歳未満	1/4包	

## 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

## 【成分・分量】

成分・分量 本剤3包（6.6g）中			
バクモンドウ ……	2.0g	ソウジュツ ……	2.0g
オウゴン ……	2.4g	トウキ ……	2.0g
キョウカツ ……	2.0g	センキュウ ……	2.0g
ドクカツ ……	2.0g	ビャクシ ……	2.0g
ボウフウ ……	2.0g	マンケイシ ……	1.2g
サイシン …… 0.8g			
カンゾウ …… 0.8g			
キクカ …… 1.2g			
ショウキョウ …… 0.8g			

より抽出した水製エキス5.4gを含有しています。

添加物として含水二酸化ケイ素、ステアリン酸マグネシウムを含有しています。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)水分が付きますと、品質の劣化をまねきますので、誤って水滴を落したり、ぬれた手で触れないでください。
- (5)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (6)使用期限を過ぎた商品は服用しないでください。
- (7)箱の「開封年月日」記入欄に、箱を開封した日付を記入してください。



本剤は生薬を原料としていますので、商品により多少色が異なることがあります。品質・効果に変わりはありません。

商品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。  
小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室  
大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106  
受付時間 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/>  
☎フリーダイヤル0120(149)931

製造販売元 **小太郎漢方製薬株式会社**  
〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号