

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

かゆい水虫にWで効く

コザックコート®Wクリーム

水虫治療薬

第2類医薬品

販売名：
コザックコートWクリーム

コザックコートWクリームは、水虫の原因菌（白せん菌）に対してすぐれた抗菌作用を発揮するトルナフタート配合の水虫治療薬です。

塗布部位に薄い被膜をつくり、薬剤が患部によくとどまる働きに加え、浸透性を高めることによるダブル効果で、水虫を治療します。

伸びが良くベタつきのない、使用感の良いクリーム剤です。

【使用上の注意】



してはいけないこと



（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。）

次の部位には使用しないでください。

- (1)目や目の周囲、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、膣等）、陰のう、外陰部等。
- (2)湿疹。
- (3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)乳幼児。
- (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4)患部が顔面又は広範囲の人。
- (5)患部が化膿している人。
- (6)「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。
（陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。）

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、熱感、乾燥感、ヒリヒリ感

3. 2週間位使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】


みずむし、ぜにたむし、
いんきんたむし

【用法・用量】

1日1～2回、適量を患部に塗布してください。

【☆ワンポイントアドバイス☆】

「いんきんたむし」は、主として、足のつけ根・太ももの内側に白せん菌が感染し、発症する疾患です。まれに、陰のう部にも感染することがあります。



陰のう部の疾患には、本剤は使用できませんので、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4)外用にのみ使用してください。

【成分】（1g中）

成分	分量	はたらき
トルナフタート	20 mg	水虫の原因菌（白せん菌）に対してすぐれた抗菌作用を発揮します。
クロタミトン	100 mg	患部のかゆみを抑えます。
ジブカイン塩酸塩	2 mg	患部の痛みやかゆみを抑えます。
グリチルレチン酸	5 mg	抗炎症、抗アレルギー作用等により患部の炎症を抑えます。
イソプロピル メチルフェノール	3 mg	患部の雑菌に対して殺菌・消毒作用を示します。

添加物としてジブチルヒドロキシルエン、ステアリルアルコール、トリエタノールアミン、パラベン、ステアリン酸グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、パルミチン酸イソプロピル、1,3-ブチレングリコール、ベヘニルアルコール、ポビドン、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ポリオキシエチレンセチルエーテルリン酸Na、N-メチル-2-ピロリドンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光のあたらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4)使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。
- (5)合成樹脂（スチロールなど）を軟化したり、塗料を溶かすことがありますので、メガネの枠、塗装家具、床（フローリングなど）等につかないようにしてください。

問い合わせ先

- 1) お買い求めのお店
- 2) 全薬工業お客様相談室
住 所：〒112-8650 東京都文京区大塚5-6-15
電 話：03（3946）3610
受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日を除く）



製造販売元 **全薬工業株式会社**
東京都文京区大塚5-6-15
<https://www.zenyaku.co.jp>