

リコリス
「ゼンヤク」
小児用



第2類医薬品

〔効能・効果〕幼小児の発育期・偏食
児・発熱性消耗性疾患・病中病後・
胃腸障害・栄養障害などの栄養
補給、虚弱体質、滋養強壮

製造販売元 **全薬工業株式会社**
東京都文京区大塚5-6-15

全薬工業お客様相談室 TEL 03(3946)3610

副作用被害救済制度
電話:0120-149-931

販売名: リコリス「ゼンヤク」小児用

使用上の注意 *本剤は小児用ですが、滋養強壮保健薬として定められた一般的な
注意事項を記載しています。

してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)長期連用しないこと。

相談すること 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

(1)医師の治療を受けている人。(2)高齢者。(3)次の症状のある人。むくみ (4)次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、腎臓病 2.服用後、まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師の診療を受けること。●偽アルドステロン症、ミオパチー:手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。3.5~6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

〔用法・用量〕3才以上15才未満、1回1びん(20mL)を1日3回服用。

*小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

〔成分〕(1びん20mL中) カンゾウ(甘草)エキス100mg(原生薬換算量500mg)、グルコン酸カルシウム水和物100mg、リボフラビン0.67mg、オロチン酸コリン25mg、タウリン100mg、パンテノール3.33mg

添加物としてアルコール、安息香酸Na、パラベン、カラメル、チンピチンキ、白糖、水アメ、DL-リンゴ酸Naを含有します。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光のあたらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手のとどかない所に保管すること。(3)使用期限を過ぎた製品は、服用しないこと。(4)キャップの切り口で手指等を切らないように注意すること。

