

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

〈漢方製剤〉

アロパノール[®] MEDICAL

第2類医薬品

販売名：アロパノールメディカル錠

錠

アロパノールメディカル錠は、

- 緊張や不安からイライラしたり、気分が悪くなる方の神経症状を緩和します。
- 神経がたかぶって「寝付きが悪い」「夜中や早朝に目が覚める」といった不眠症状を改善します。
- 製剤の安定化、服用しやすさを考慮し、錠剤にフィルムコーティング（薄い被膜）を施しています。

【使用上の注意】



相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 胃腸の弱い人。
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
心不全	動くと息が苦しい、疲れやすい、足がむくむ、急に体重が増えた。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位（小児夜泣きに服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

成 分 （9錠中）

抑肝散エキス（1/2量） 1,700mg

チョウトウコウ		1.5 g	
サイコ		1.0 g	
カンゾウ（甘草）		0.75 g	
トウキ		1.5 g	
センキュウ		1.5 g	
ブクリョウ		2.0 g	
ビャクジュツ		2.0 g	より抽出。

添加物としてタルク、ヒドロキシプロピルセルロース、キサンタンガム、クロスカルメロースNa、ケイ酸Ca、硬化油、酸化チタン、三二酸化鉄、ステアリン酸Mg、セルロース、ヒプロメロース、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、無水ケイ酸、メタケイ酸アルミン酸Mgを含有します。

効能・効果

体力中等度をめやすとして、神経がたかぶり、怒りやすい、イライラなどがあるものの次の諸症：神経症、不眠症、小児夜泣き、小児痙症（神経過敏）、歯ぎしり、更年期障害、血の道症

〈効能・効果に関連する注意〉

- (1) 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期などの女性ホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状及び身体症状のことです。
- (2) 小児痙症（しょうにかんしょう）とは、神経の興奮によっておこる「イライラ・怒りっぽいなどの感情のたかぶり、ひきつけ、興奮して眠れない、筋肉のひきつりやけいれんなど」の小児の症状です。

体力中等度をめやすとして、神経のたかぶりなどがある方の
こんな症状に



●ささいなことが気になる



●気持ちがたかぶり
イライラする

用法・用量

次の量を食前又は食間※に服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	3錠	3回
5才以上 15才未満	2錠	
5才未満	服用しないこと	

※食間：「食事と食事の間」という意味で、食後2～3時間を指します。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 本剤は水又はぬるま湯で服用してください。
- (3) 錠剤の取り出し方

錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながる。）



保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光のあたらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

問い合わせ先

- 1) お買い求めのお店
- 2) 全薬工業お客様相談室
住 所：〒112-8650 東京都文京区大塚5-6-15
電 話：03 (3946) 3610
受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日を除く）



製造販売元 **全薬工業株式会社**
東京都文京区大塚5-6-15
<https://www.zenyaku.co.jp>