

緊張・イライラ・不眠に

液

AROPANOL
アロパノール[®] MEDICAL

アロパノールメディカル液

第2類医薬品

全薬工業株式会社

開封口

第2類医薬品

販売名：アロパノールメディカル液

服用に際して、この箱の表示を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるようこの箱を大切に保管してください。

特長

- 緊張や不安からイライラしたり、気分が悪くなる方の神経症状を緩和します。
- 神経がたかぶって「寝付きが悪い」「夜中や早朝に目が覚める」といった不眠症状を改善します。
- 1回1本のみきりタイプの液剤です。

使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人。 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3) 胃腸の弱い人。
(4) 高齢者。 (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
(6) 次の症状のある人。 むくみ (7) 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
心不全	動くと息が苦しい、疲れやすい、足がむくむ、急に体重が増えた。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

体力中等度をめやすとして、神経がたかぶり、怒りやすい、イライラなどがあるものの次の諸症：
神経症、不眠症、歯ぎしり、更年期障害、血の道症。

<効能・効果に関連する注意>

血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期などの女性ホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状及び身体症状のことです。

成分

(1日量 3びん90mL中)

抑肝散濃縮液…………… 81mL

〔
チョウトウコウ…………… 3.0g
サイコ…………… 2.0g
カンゾウ(甘草)…………… 1.5g
トウキ…………… 3.0g
センキュウ…………… 3.0g
ブクリョウ…………… 4.0g
ビャクジュツ…………… 4.0g
より抽出。〕

添加物として安息香酸Na、パラベン、スクラロース、ステビア抽出物を含有します。

用法・用量

次の量を食前又は食間※によく振ってから服用してください。

年 齢	1回量	1日 服用回数
成人 (15才以上)	1びん	3回
15才未満	服用しないこと	

※食間:「食事と食事の間」という意味で、食後2～3時間を指します。
○生薬エキス配合製剤ですので、沈殿を生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用してください。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光のあたらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。
- (4)キャップの切り口で手指等を切らないように注意してください。

製造販売元

新生薬品工業株式会社

奈良県高市郡高取町清水谷1269

発売元

全薬工業株式会社

東京都文京区大塚5-6-15

<https://www.zenyaku.co.jp>

全薬工業お客様相談室 TEL 03(3946)3610

〈月～金曜日9:00～17:00(祝日を除く)〉

