

医薬部外品 販売名:リポビタミンアミノNEW
服用に際しては、説明書きをよく読んでください。

【使用上の注意】 **相談すること**

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

皮膚:発疹/消化器:胃部不快感

(2) しばらく服用しても症状がよくなる場合。

2. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください 下痢

【用法・用量】成人(15才以上)1日1回1本(100mL)を服用してください。

※15才未満は服用しないでください。

【注意】定められた用法・用量を厳守してください。
(他のビタミン等を含有する製品を同時に服用する場合には過剰摂取等に注意してください)

*BCAA:Branched Chain Amino Acid
(分岐鎖アミノ酸)

大正製薬(株)お客様119番室 電話03-3985-1800

医薬部外品

アミノ酸配合製剤



100mL

大正製薬  株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号

【成分】100mL中 タウリン 1500mg、L-バリン 80mg、L-ロイシン 240mg、L-イソロイシン 100mg、L-アルギニン塩酸塩 300mg、チアミン硝酸塩(ビタミンB1) 5mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2) 5mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6) 10mg、ニコチン酸アミド 20mg、イノシトール 50mg、ロイヤルゼリー 200mg、無水カフェイン 50mg

添加物:白糖、D-ソルビトール、ポビドン、クエン酸水和物、クエン酸ナトリウム水和物、pH調節剤、安息香酸Na、香料、バニリン

【注意】本剤の服用により、尿が黄色になることがありますが、これは本剤中のビタミンB2によるもので、ご心配ありません。

【効能】☆肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給☆滋養強壮☆虚弱体質

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手のとどかない所に保管してください。(3) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。