

使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

スマートフォンで酷使した目の疲れに

アイリスフォンブレイク_T

第2類医薬品

〈目薬〉

IRIS BREAK

販売名：
アイリスフォン
ブレイク_T

- ◆現代人のスマートフォンによる目の疲れは、近くにピントを合わせ続けることで毛様体筋が縮み続け、更に至近距離から光を浴び続けたり、画面を上下左右に細かく目を動かし続けたりすることで引き起こされます。
- ◆アイリスフォンブレイク_Tは、長時間作業による光ダメージからくる目の疲れ、炎症を改善します。
- ◆ピント調節機能改善成分を基準内最大濃度配合^{※1}。突き抜ける最強^{※2}清涼感で爽快クール。
- ◆国内最多^{※3}となる12種類の有効成分配合。
- ※1 一般用眼科用薬製造販売承認基準内最大濃度配合
- ※2 アイリスシリーズ内で
- ※3 一般用眼科用薬製造販売承認基準内最多有効成分数配合
- 承認基準とは、厚生労働省が承認事務の効率化を図るために定めた医薬品の範囲のこと



使用上の注意



相談すること



① 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 次の症状のある人。
はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人。
緑内障

② 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

③ 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 目のかすみが改善されない場合。
- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合。

効 能

紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、目の疲れ、結膜充血、目のかゆみ、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、目のかすみ(目やにの多いときなど)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

用法・用量

1日5～6回、1回2～3滴点眼してください。

〔注意〕

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 容器の先をまぶた、まつ毛にふれさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (5) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (6) 点眼用にのみ使用してください。

成分、保管及び取扱い上の注意については、裏面をよくご覧ください。

成 分		
成 分	分 量	はたらき
ネオスチグミンメチル硫酸塩	0.005%	ピント調節機能改善作用により、目の疲れを改善します。
タウリン	1%	目に大切な栄養を与え、目の疲れを改善します。
L-アスパラギン酸カリウム	0.9%	
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	0.05%	目の組織代謝を活発にします(目の疲れを改善)。
パンテノール	0.05%	
酢酸 <i>d</i> - α -トコフェロール(天然型ビタミンE)	0.01%	血行を促進して、目の疲れを改善します。
イプシロン-アミノカプロン酸	1%	目の炎症を鎮めます。
ベルベリン塩化物水和物	0.015%	
グリチルリチン酸二カリウム	0.1%	
塩酸テトラヒドロゾリン	0.01%	結膜(白目部分等)の充血をおさえます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.03%	抗ヒスタミン作用により、目のかゆみをおさえます。
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	0.05%	涙を保持する作用により角膜表面を保護し、目にうるおいを保ちます。

添加物：ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート80、ユーカリ油、*L*-メントール、エデト酸Na、ホウ酸、ベンザルコニウム塩化物、pH調節剤

[注意]
 本剤の点眼後、口中に甘みを感じることがありますが、これは有効成分のグリチルリチン酸二カリウムによるものですから、ご心配ありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)車のダッシュボード等高温下に放置しないでください。(容器の変形や薬液の品質が劣化することがあります)
- (6)点眼中に薬液がこぼれ衣服などが着色したらすぐに水洗いしてください。(本剤の黄色は成分のベルベリン塩化物水和物によるものです)
- (7)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべくはやく使用してください。(品質保持のため)
- (8)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合は、清潔なガーゼなどで軽くふきとって使用してください。



目薬をさす時の注意と正しいさし方

キャップの開閉方法 必ずキャップを上に向けて開閉してください。

❌

① 開け方
 容器の側面をもち
 キャップをひねる

② 閉め方
 音がするまで
 キャップを
 まっすぐ押す

カチッ

容器の広い部分をもって開閉すると、薬液が飛び出すことがあります。

注 意

- 容器の先がまぶたやまつ毛にふれると、目やにや雑菌等のため、薬液が汚染又は混濁することがありますので注意してください。

正しいさし方

- 手をよく洗い、目に直接指がふれないようにしてください。
- やや上を向いて指で下まぶたをさげ、まぶたの裏側にしずくを落とししてください。

容器の先が
目やまつ毛にふれないように

この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室

電話 03-3985-1800

受付時間 8:30～17:00(土、日、祝日を除く)

※受付時間の詳細は、大正製薬ホームページにてご確認ください

発売元

大正製薬株式会社
 東京都豊島区高田 3 丁目24番 1 号
<https://brand.taisho.co.jp/iris/>

製造販売元

テイカ製薬株式会社
 富山県富山市荒川 1 丁目 3 番27号

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
 電話：0120-149-931(フリーダイヤル)