



タウリン

+

グリシン

睡眠サポート成分

疲労回復・予防  
栄養補給

リポビタン  
DX

※寝つきの悪さや眠りの浅さ

栄養の偏りによる睡眠の悩みに

毎日感じるその疲れに

ノンカフェイン 寝る前にも

1日1回3錠で効く

小さくて



飲みやすい

指定医薬部外品

指定医薬部外品

販売名:リポビタンtb

開  
け  
口

開  
け  
口

服用に際しては、この説明文を必ず読んでください。

開封後はチャックをしっかりと閉めて保管してください。↓

## ⚠ 使用上の注意

### 相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 皮膚:発疹/消化器:胃部不快感 2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 下痢 3.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

**効 能** ★疲労の回復・予防 ★日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防:疲れやすい・疲れが残る・体力がない・身体が重い・身体がだるい、肩・首・腰又は膝の不調、二日酔いに伴う食欲の低下・だるさ、寝付きが悪い・眠りが浅い・目覚めが悪い、肌の不調(肌荒れ、肌の乾燥) ★体力、身体抵抗力又は集中力の維持・改善 ★虚弱体質(加齢による身体虚弱を含む。)に伴う身体不調の改善・予防:疲れやすい・疲れが残る・体力がない・身体が重い・身体がだるい、肩・首・腰又は膝の不調、寝付きが悪い・眠りが浅い・目覚めが悪い、肌の不調(肌荒れ、肌の乾燥) ★病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期又は産前産後等の栄養補給

**用法・用量** 成人(15才以上)1日1回3錠を水又はぬるま湯で服用してください。

※15才未満は服用しないでください。[注意]定められた用法・用量を厳守してください。(他のビタミン等を含む製品を同時に服用する場合には過剰摂取等に注意してください)

**成 分(3錠中)** タウリン 500mg、チアミン硝酸塩(ビタミンB<sub>1</sub>) 10mg、リボフラビン(ビタミンB<sub>2</sub>) 5mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB<sub>6</sub>) 5mg、アスコルビン酸カルシウム 100mg(ビタミンCとして 82.6mg)、カルニチン塩化物 10mg、グリシン 5mg、サンヤク末 10mg、シゴカ乾燥エキス 8mg(シゴカ 200mgに相当) 添加物:無水ケイ酸、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、タルク、マクロゴール、酸化チタン、ヒプロメロース、三二酸化鉄、カルナウバロウ

[注意]●本剤は、生薬を用いた製品ですから、製品により色が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。●本剤の服用により、尿が黄色になることがありますが、これは本剤中のビタミンB<sub>2</sub>によるもので、ご心配ありません。



大正製薬株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号  
<https://www.taisho.co.jp/>

お客様119番室

☎ 03-3985-1800

🕒 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)

### —— 保管及び取扱い上の注意 ——

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックをしっかりと閉めて保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く服用してください。(品質保持のため)